

ウチダのせんぶり 10g

第3類医薬品

ウチダのせんぶり

10g

日本薬局方センブリ 日本産

用法・用量 大人(15歳以上)は1日量1.5gを、水約300mLで約半量になるまで煮つめ、滓を取り去り、食前または食間3回に分服、あるいは熱湯中に浸して振出し、その振出液を服用する。

用法・用量に関連する注意 定められた用法・用量を厳守すること。

効能・効果 胃弱、食欲不振、胃部・腹部膨満感、消化不良、食べ過ぎ、飲み過ぎ、胃のむかつき

ロット：0002913 使用期限：0000.00

▲ 使用上の注意

相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
医師の治療を受けている人。
2. 2週間位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)

※本品には、品質保持(カビ・虫害等防止)のために脱酸素剤が入っています。


4 987359 773600

脱酸素剤封入

製品情報はこちら



センブリ

副作用被害救済制度
電話 0120-149-931

株式会社ウチダ和漢薬 <お問合せ先>お客様相談センター
新潟県上越市大潟区蜘蛛池1755-3 電話番号 03-3806-4141
受付時間 9:00~17:30(土、日、祝日を除く)

ウチダのせんぶり 250g

第3類医薬品

ウチダのせんぶり

250g

日本薬局方センブリ 日本産

用法・用量 大人(15歳以上)は1日量1.5gを、水約300mLで約半量になるまで煮つめ、滓を取り去り、食前または食間3回に分服、あるいは熱湯中に浸して振出し、その振出液を服用する。

用法・用量に関連する注意 定められた用法・用量を厳守すること。

効能・効果 胃弱、食欲不振、胃部・腹部膨満感、消化不良、食べ過ぎ、飲み過ぎ、胃のむかつき

▲ 使用上の注意

相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
医師の治療を受けている人
2. 2週間位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)

※本品には、品質保持(カビ・虫害等防止)のために脱酸素剤が入っています。

ロット：0002912 使用期限：0000.00

脱酸素剤封入

副作用被害救済制度
電話 0120-149-931


4 987359 773709

センブリ

副作

株式会社ウチダ和漢薬 <お問合せ先> お客様相談センター
新潟県上越市大潟区蜘蛛池1755-3 電話番号 03-3806-4141
受付時間 9:00~17:30(土、日、祝日を除く)

製品情報はこちら