

第3類医薬品

ウチダの和漢生薬

ウチダの どくだみ P

日本薬局方 ジュウヤク



使用上の注意



相談すること

- 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- 次の場合は、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師又は薬剤師に相談すること
2週間位服用しても症状がよくなる場合

お問い合わせ先

本品の内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店または下記にお願い申し上げます。

株式会社 ウチダ和漢薬 03 - 3806 - 4141

受付時間 9:00~17:30(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度の問合せ先

(独) 医薬品医療機器総合機構

<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>

電話 0120-149-931(フリーダイヤル)

効能・効果

便秘、尿量減少、便秘に伴う吹出物

用法・用量

年齢	1日量
大人(15歳以上)	15gを、水約600mLをもって煮て約400mLに煮つめ、滓をこして取り去り、食前または食間3回に分服する。
15歳未満	服用しないこと

用法・用量に関連する注意

定められた用法・用量を厳守すること。

成分・分量

1日量(1袋)中
日本薬局方ジュウヤク 15g

保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- 小児の手の届かない所に保管すること。
- 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)

