

ウチダの黄柏末 75g



MTB

**第3類医薬品** **ウチダの黄柏末 75g**

日本薬局方オウバク末

**用法・用量** 大人（15歳以上）は1回量1g、1日3回、食前または食間に服用する。外用は水で練って貼る。

**用法・用量に関連する注意** 1回量は添付のサジ約3杯です。

**内用** 定められた用法・用量を厳守すること。

**外用** (1) 定められた用法・用量を厳守すること。  
 (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。  
 (3) 目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐ水又はぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること。

**効能・効果** (内用) 胃弱、食欲不振、胃部・腹部膨満感、消化不良、食べ過ぎ、飲み過ぎ、胃のむかつき、下痢  
 (外用) うちみ、ねんざ

**⚠ 使用上の注意**

**■ 相談すること**

**内用** 1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること  
 (1) 医師の治療を受けている人。  
 (2) 発熱を伴う下痢のある人、高齢者。  
 (3) 血便のある人、粘液便の続く人。  
 2. 1週間位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

**外用** 1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること  
 (1) 医師の治療を受けている人。  
 (2) 今までに薬や化粧品等によるアレルギー症状（例えば発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等）を起こしたことがある人。  
 (3) 切傷等の外傷のある人。  
 2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること


関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

3. 5～6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

**保管及び取扱い上の注意**  
 (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。  
 (2) 小児の手の届かない所に保管すること。  
 (3) 他の容器に入れ替えないこと。（誤用の原因になったり品質が変わる。）

<お問合せ先>お客様相談センター  
 株式会社ウチダ和漢薬 電話 03-3806-4141  
 受付時間 9:00～17:30（土、日、祝日を除く）

副作用被害救済制度  
 電話 0120-149-931

 スプーン袋：PE  
 内 袋：PP

# ウチダの黄柏末 500g



第3類医薬品 **ウチダの黄柏末** MNB  
日本薬局方オウバク末

**用法・用量** 大人（15歳以上）は1回量1g、1日3回、食前または食間に服用する。外用は水で練って貼る。

**用法・用量に関連する注意** 1回量は添付のサジ約3杯です。

**内用** 定められた用法・用量を厳守すること。  
**外用** (1) 定められた用法・用量を厳守すること。  
(2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。  
(3) 目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐ水又はぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること。

**効能・効果** (内用) 胃弱、食欲不振、胃部・腹部膨満感、消化不良、食べ過ぎ、飲み過ぎ、胃のむかつき、下痢  
(外用) うちみ、ねんざ

**⚠ 使用上の注意**

**🏠 相談すること**

**内用** 1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること  
(1) 医師の治療を受けている人。  
(2) 発熱を伴う下痢のある人、高齢者。  
(3) 血便のある人、粘液便の続く人。  
2. 1週間位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

**外用** 1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること  
(1) 医師の治療を受けている人。  
(2) 今までに薬や化粧品等によるアレルギー症状（例えば発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等）を起こしたことがある人。  
(3) 切傷等の外傷のある人。  
2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるため、直ちに使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること


関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

3. 5～6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

**保管及び取扱い上の注意**  
(1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。  
(2) 小児の手の届かない所に保管すること。  
(3) 他の容器に入れ替えないこと。（誤用の原因になったり品質が変わる。）

●お問合せ先  
株式会社ウチダ和漢薬 電話 03-3806-4141  
受付時間 9:00～17:30（土、日、祝日を除く）

副作用被害救済制度  
電話 0120-149-931

 スプーン袋：PE