

ご使用に際しては、この添付文書を必ずお読み下さい。また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

第2類医薬品

伝統漢方研究会 紫丹精

紫丹精は、漢方でいわれる「瘀血・血滯」を改善するものです。中年以降または血圧が高く、頭痛、頭重、肩こり、めまい、動悸などの症状のある方の血行を改善し、効果をもたらします。

●お問い合わせ先

本品の内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店または下記にお願い申し上げます。

株式会社 ウチダ和漢薬 03-3806-4141
受付時間 9:00~17:30（土、日、祝日を除く）



使用上の注意



相談すること

- 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること
 - 医師又は歯科医師の治療を受けている人。
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - 今までに薬によるアレルギー症状（たとえば発熱、発疹、ぜんそく、かゆみ等）を起こしたことがある人。
- 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること

(1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	食欲不振、胃部不快感、腹部膨満感、悪心・嘔吐、胃痛
その他	異常出血、動悸、のぼせ、ほてり、ふらつき

(2) 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合

- 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談すること
下痢

効能・効果

中年以降または高血圧傾向のあるものの次の諸症：
頭痛、頭重、肩こり、めまい、動悸。

用法・用量

次の1回量を1日3回、食間または空腹時に服用する。

年齢	1回量
成人（15歳以上）	1包
15歳未満	服用しないこと

成分・分量

1日量3包（1包2g）中

二号方エキス	4.5g
センキュウ	2.250g
シャクヤク	2.250g
コウカ	2.250g
モッコウ	1.125g
コウブシ	1.125g
丹参	4.500g

賦形剤として乳糖・パレイシヨデンブン、吸湿防止剤としてメタケイ酸アルミン酸Mgを含有する。

保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- 小児の手の届かない所に保管すること。
- 他の容器に入れ替えないこと。（誤用の原因になったり品質が変わる。）

本剤は生薬を原料としていますので、製品により多少色が異なることがあります。効能・効果にかわりはありません。

製造販売元

株式会社 ウチダ和漢薬
東京都中央区日本橋本町 4-2-8

伝統漢方研究会
佐賀県唐津市二夕子 3-13-13(有)MDR内