

ご使用に際して、この説明書を必ず読んで下さい。
また、必要な時に読めるよう本剤とともに保管して下さい。

ウチダのヨクイニンエキス細粒（分包）

第3類医薬品

ウチダのヨクイニンエキス細粒（分包）は、肌あれ・いぼとりに愛用されている日本薬局方ヨクイニン（ハトムギの種子）から抽出したエキスを服用しやすい細粒の分包にしたものです。

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる）

次の人は服用しないこと
生後3ヵ月未満の乳児。



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 胃腸の弱い人。
- (4) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	胃部不快感

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

下痢

4. 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

【効能・効果】

いぼ、皮膚のあれ

【用法・用量】

次の1回量を1日3回食前または食間に服用する。

年 齢	1回量	1日服用回数	年 齢	1回量	1日服用回数
大人(15歳以上)	1包	3回	7歳未満4歳以上	1/2包	3回
15歳未満7歳以上	2/3包		4歳未満2歳以上	1/3包	
			2歳未満	1/4包	

【用法・用量に関連する注意】

- (1) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。
- (2) 1歳未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、止むを得ない場合にのみ服用させること。

【成分・分量】 [本品1日量3包（1包2g）中]

ヨクイニンエキス

（原生薬換算量20g）……………1.50g

賦形剤として乳糖水和物・バレイシヨデンブン、吸湿防止剤としてメタケイ酸アルミン酸Mgを含有する。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。（誤用の原因になったり品質が変わる。）
- (4) 小児で1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り曲げて保管し、2日以内に服用すること。
- (5) 本剤は生薬を原料としておりますので、製品により多少色が異なることがありますが、効能・効果にかわりはありません。



【問い合わせ先】

本製品についてのお問合せは、お買い求めのお店、または下記にお願い申し上げます。

東洋漢方製薬株式会社「お客様相談室」

電話 0120-00-1040

受付時間 9:00~17:00（土、日、祝日を除く）

副作用被害救済制度の問合せ先
電話 0120-149-931

東洋漢方製薬株式会社

発売元 大阪府富田林市中野町東2丁目1番16号

株式会社 ウチダ和漢薬
製造販売元 東京都荒川区東日暮里4-3-4