

2021(令和3)年4月改訂

第3類医薬品

日本薬局方

ヨクイニン

【使用上の注意】

相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 今まで薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は、副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	胃部不快感

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

下痢

4. 1ヶ月位服用しても症状がよくなる場合は、服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

【効能・効果】

いぼ、皮膚のあれ

【用法・用量】

年 齢	1日量
大人 (15歳以上)	本品30gを、水約600mlをもって煮て、約400mlに煮詰め、滓をこして取り去り食前または食間3回に分服する。
15歳未満	服用しないこと

【成分・分量】

1日量(30g)中 日本薬局方 ヨクイニン 30g

【保管及び取扱い上の注意】

1. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
2. 小児の手のとどかない所に保管してください。
3. 他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わる)

※浸煎剤は腐敗を防ぐため冷所に保存してください。
※本品には防虫・防カビのために脱酸素剤を封入しておりますが、これを本品と一緒に煎じたり食べたりしないようご注意ください。

副作用被害救済制度 電話0120-149-931

お客さま相談窓口

本製品内容についてのお問い合わせは、下記にお願い申し上げます。

電話:(076)431-7017 FAX:(076)431-7013

受付時間:午前9時から午後4時30分まで(土、日、祝日を除く)