

第2類医薬品

生薬

アルクール®

Harcourt

富山常備薬グループ

開封口

服用前に、箱の説明書をよくお読みください。また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

生薬製剤

販売名：アルクール®

第2類医薬品

⚠ 使用上の注意

👤 相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。
 - 医師の治療を受けている人
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人
 - 胃腸が弱く下痢しやすい人
 - 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振、胃部不快感、腹痛

- 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。
下痢
- 1ヵ月位服用しても症状がよならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。
- 他の医薬品等を併用する場合には、含有成分の重複に注意する必要がありますので、医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

【用法・用量】

次の量を随時、コップ半分以上のぬるま湯にて服用してください。

年齢	1回量	1日服用回数
大人	3カプセル	2~3回
15歳未満	服用しないでください	

<用法・用量に関連する注意>
用法・用量を厳守してください。

【保管及び取扱い上の注意】

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)
- 容器の中の詰め物は、開封後に捨ててください。
(詰め物は、カプセル剤が輸送中に破損するのを防止するためのものです)
- 服用の都度、容器のキャップをしっかりと閉めてください。
- カプセル剤は濡れた手で扱わないでください。
- 使用期限の過ぎた製品は服用しないでください。

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931

お問い合わせ先 株式会社富山常備薬グループ
医薬品相談窓口

☎ 0120-137-093

受付時間：9時~18時(年中無休)

発売元 株式会社富山常備薬グループ
富山県富山市丸の内1-8-17

製造販売元 剤盛堂薬品株式会社
和歌山市太田二丁目8番31号

第2類医薬品

ひざ・腰・肩などの 31日分 279カプセル

ロイマチス

関節 神経 痛
腰 筋肉 打撲

生薬

アルクール®

Harcourt

生薬水製エキス

カンゾウ末・ショウキョウ末
ソウジュツ末・チンピ末
ブクリョウ末・リュウタン末

富山常備薬グループ

【成分・分量】 1日最大服用量：9カプセル(4.5g)中

イレイセン……0.3g
カンゾウ……0.05g
キョウカツ……0.5g
ゴシツ……0.5g
ジオウ……0.7g
シャクヤク……0.8g
ショウキョウ……0.05g
センキュウ……0.7g
ソウジュツ……0.05g
チンピ……0.1g
トウキ……0.7g
トウニン……0.2g
ビャクシ……0.2g
ブクリョウ……0.05g
ポウフウ……0.5g
リュウタン……0.05g

水製エキス……0.7g

カンゾウ末……0.9g
ショウキョウ末……0.1g
ソウジュツ末……1.3g
チンピ末……0.05g
ブクリョウ末……1.4g
リュウタン末……0.05g

添加物として赤色3号、青色1号、酸化チタン、ゼラチン、ラウリル硫酸ナトリウムを含有します。

本剤は天然の生薬を原料としていますが、内容物の色調は多少異なることがあります。効果に変わりはありません。

【効能・効果】

ロイマチス、神経痛、関節痛、筋肉痛、腰痛、打撲痛

製造番号

使用期限



4 580544 060198