

# Kracie

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるように大切に保管してください。

第2類医薬品

生薬製剤

## コイクラセリド

### 特 徴

- 「コイクラセリド」は、ヨクイニン・カゴソウ・カンゾウを配合した生薬製剤です。
- いぼ、さめ肌、ソバカス、肌あれに効果があります。

### ⚠️ 使用上の注意



#### 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
  - (1) 医師の治療を受けている人
  - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
  - (3) 高齢者
  - (4) 次の症状のある人  
むくみ
  - (5) 次の診断を受けた人  
高血圧、心臓病、腎臓病

2. 服用後、まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は副作用の可能性があるため、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師の診療を受けてください

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症、 ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。

3. 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
4. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
5. 他の医薬品等を併用する場合には、含有成分の重複に注意する必要があるため、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

### 効 能

いぼ、さめ肌、ソバカス、肌あれ



## 用法・用量

次の量を1日3回食後に水又は白湯にて服用。

年齢	1回量	1日服用回数
成人(15才以上)	1包	3回
15才未満12才以上	2/3包	
12才未満7才以上	1/2包	
7才未満4才以上	1/3包	
4才未満	服用しないこと	

### 〈用法・用量に関連する注意〉

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

## 成分

成人1日の服用量3包(1包1.5g)中、次の成分を含んでいます。

下記生薬より抽出したエキス……0.90g

〔カゴソウ2.4g、ヨクイニン12.0g〕

カンゾウ末……3.6g

### 〈成分に関連する注意〉


本剤は天然物(生薬)を用いていますので、製品により色が多少異なることがあります。

## 保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。  
(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。
- (5)1包を分割した残りを服用する時は、袋の口を折り返して保管し、2日を過ぎた場合には服用しないでください。



### お薬の上手な飲み方



先に水または白湯(さゆ)をお口に含み、その上にお薬を入れて、一緒に飲みましょう。スティックの先をぬらさないようご注意ください。最後にもう一度水または白湯を飲みましょう。

副作用被害救済制度の問合せ先  
(独)医薬品医療機器総合機構  
<http://www.pmda.go.jp/>  
☎ 0120-149-931

本剤について、何かお気づきの点がございましたら、お買い求めのお店又は下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

クラシエ薬品株式会社 お客様相談窓口 ☎ (03) 5446-3334  
受付時間 10:00~17:00 (土、日、祝日を除く)

ホームページ [www.kracie.co.jp](http://www.kracie.co.jp)

発売元 **クラシエ薬品株式会社**  
東京都港区海岸3-20-20 (〒108-8080)

製造販売元 **剂盛堂薬品株式会社**  
和歌山市太田二丁目8番31号 (〒640-8323)