

【用法・用量】次の量を1日3回、食前又は食間に、コップ半分以上のぬるま湯にて服用してください。

年 齢	1 回量
成人(15歳以上)	1 包
10歳以上15歳未満	2/3包
5歳以上10歳未満	1/2包

5歳未満は服用しないでください

〈用法・用量に関連する注意〉

(1)用法・用量を厳守すること。(2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

【保管及び取扱い上の注意】

(1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。(2)小児の手の届かない所に保管すること。(3)他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)(4)1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用すること。

● 販売元
株式会社京福堂
大阪府大阪市西区
靱本町2丁目3-2

● 発売元
株式会社天真堂
東京都江東区木場
2-17-13

● 製造販売元
劑盛堂薬品株式会社
和歌山市太田二丁目
8番31号

早漏にも陰萎にも効く

強活腎散

株式会社 京福堂

15包

第2類医薬品

本製品についてのお問い合わせは、下記にお願い申し上げます。

【製品のお問合せ】

06-7633-8981

【お客様サポートセンター】

0570-200-885

受付時間/10:00～
18:00(土日祝を除く)

副作用被害救済制度
☎0120-149-931

生薬製剤 強活腎散

第2類医薬品

1.5g×15包

この説明文書は、お薬とともに保管し、服用の際には、必ずお読みください。

⚠ 使用上の注意

❌ **してはいけないこと** (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

次の人は服用しないこと(1)胃腸の弱い人。(2)下痢しやすい人。

🗉 **相談すること**

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること(1)医師の治療を受けている人。(2)妊婦又は妊娠していると思われる人。(3)のぼせが強く赤ら顔で体力の充実している人。(4)今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	食欲不振、胃部不快感、腹痛
その他	動悸、のぼせ

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること 下痢 4. 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

【効能・効果】膀胱カタル、腎臓病、腰痛、高血圧、糖尿病、脚気、早漏、陰萎

※陰萎とは勃起不全のことです。

【成分・分量】1 日量 3 包(4.5 g)中
(サンヤク737.7mg・タクシャ 184.4mg)エキス
3.437mL(固形物として73.8mg)、ケイ
ヒ末170.0mg、サンヤク末680.2mg、
ソウジュツ末1.7mg、タクシャ末
510.1mg、ブクリョウ末510.1mg、ボ
タンピ末510.1mg、サンシュユ末
680.2mg、ジオウ末1360.4mg、ニン
ジン末1.7mg、チンピ末1.7mg

本剤は天然の生薬を原料としていますので、多少色調の異なることがありますが、効果に変わりはありません。

製造
番号

使用
期限

紙箱

PP
バンド

調剤口