

血糖値が
気になる方に

口の
糖
病
の
尿
の
渴
の
渴
の
渴
の
渴

生薬

ケイヒ末
3,000mg

ケイヒゲン

第3類医薬品 450錠 1日15錠 30日分



ビンの中の詰め物は錠剤の破損防止のためです。服用時に捨ててください。

セルフメディケーションジャパン

第3類医薬品

ケイヒゲン

成分・分量 1日量：15錠中

●ケイヒ末…3,000mg
添加物として、結晶セルロース、軽質無水ケイ酸、ステアリン酸マグネシウムを含む。

効能・効果

●口渇、のどの渴き、糖尿病

用法・用量

次の量を1日3回、毎食後に服用してください。

年齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	5錠	3回
15歳未満	服用しないこと	

【用法・用量に関連する注意】

定められた用法・用量を厳守してください。

使用期限 製造番号

第3類医薬品

ケイヒ末 3,000mg
ケイヒゲン

口の
糖
病
の
尿
の
渴
の
渴
の
渴

血糖値が
気になる方に

口の
糖
病
の
尿
の
渴
の
渴
の
渴

生薬

ケイヒ末
3,000mg

ケイヒゲン

第3類医薬品 450錠 1日15錠 30日分

開封時時刻記入してください。

開封年月日

使用上の注意

相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3) 今までに薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。
- | 関係部位 | 症状 |
|------|-----------|
| 皮膚 | 発疹・発赤、かゆみ |
- 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

【保管及び取扱い上の注意】

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり、品質が変わります。)
- 本品は吸湿性が高いので、湿気により変色や亀裂など品質に影響を与える恐れがありますので、次の点にご注意ください。
○服用のつどフタをよく閉めてご使用ください。
○ぬれた手で触れないでください。又、一度取り出して手に乗せた錠剤は元に戻さないでください(変質防止のため)。
- 本剤は天然物(生薬)を用いているため、錠剤の色が多少異なることがあります。
- 使用期限(外箱・ラベルに記載)を過ぎた製品は服用しないでください。なお、期限内であっても、一度開封した後は、品質保持の点から開封日より6ヵ月以内に服用してください。

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

お問い合わせ先
株式会社セルフメディケーションジャパン
お客様相談室
☎0120-566-677
受付時間 9:00~17:30(土・日・祝日を除く)

発売元 株式会社セルフメディケーションジャパン
大阪市北区茶屋町19-19アプロースタワー18F

製造販売元 至誠堂製薬株式会社
奈良県御所市茅原220-1

版No.1