



ピンの中の詰め物は錠剤の破損防止のためです。服用時に捨ててください。

第3類医薬品

血糖値が 気になる方に

のどの渇き 糖尿病 口渇

生薬 ケイヒ末
3000mg

ナラカラゲン

1日15錠 31日分 465錠

奈良大和生薬



第3類医薬品

生薬 ナラカラゲン

ナラカラゲンに含まれるケイヒは、古くから中国で愛用されている生薬です。本製剤は、現代における生活習慣病にかかわりの深い血糖値に働きかけます。有効成分はケイヒ100%で、錠剤タイプの飲みやすくして身体に優しいお薬です。

成分・分量 1日量:15錠中

●ケイヒ末……………3000mg
添加物として、結晶セルロース、軽質無水ケイ酸、ステアリン酸マグネシウムを含む。

効能・効果

●口渇、のどの渇き、糖尿病

用法・用量

次の量を食後に服用してください。

年齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	5錠	3回
15歳未満	服用しないこと	

【用法・用量に関連する注意】

定められた用法・用量を厳守してください。

使用期限 製造番号

ナラカラゲン

生薬 ケイヒ末 3000mg

のどの渇き 糖尿病 口渇

第3類医薬品

… 糖尿病とは …

生活習慣と社会環境の変化に伴って急速に増加している糖尿病。放置すると網膜症・腎症・神経障害などの合併症を引き起こし、末期には失明したり透析治療が必要となることもあります。また脳卒中などの心血管疾患の発症・進展を促進する場合も。糖尿病の病型は、

1型糖尿病 2型糖尿病 その他 妊娠糖尿病

に大別でき、日本の糖尿病の大部分をしめるものは2型糖尿病です。

この2型糖尿病は生活習慣が環境因子として重要です。

この疾患の対策としては、発症の予防・早期発見・合併症の予防が重要です。

まずは医師の診断を。

血糖値が少し高いと言われた方。

奈良大和生薬の『ナラカラゲン』は血糖値を緩やかに下げる作用がございます。

株式会社 奈良大和生薬

開封年月日

▲ 使用上の注意

相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3) 今までに薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

- 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

【保管及び取り扱い上の注意】

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり、品質が変わります。)
- 本品は吸湿性が高いので、湿気により変色や亀裂など品質に影響を与える恐れがありますので、次の点にご注意ください。
○服用のつどフタをよく閉めてご使用ください。
○ぬれた手で触れないでください。又、一度取り出して手に乗せた錠剤は元に戻さないでください(変質防止のため)。
- 本剤は天然物(生薬)を用いているため、錠剤の色が多少異なることがあります。
- 使用期限(外箱・ラベルに記載)を過ぎた製品は服用しないでください。なお、期限内であっても、一度開封した後は、品質保証の点から開封日より6ヵ月以内に服用してください。

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

お問い合わせ先 株式会社奈良大和生薬
医薬品相談窓口
☎0120-005-189
受付時間 10:00~17:00(土・日・祝日を除く)

発 売 元 株式会社奈良大和生薬
奈良県奈良市二条大路南1-2-11

製造販売元 至誠堂製薬株式会社
奈良県御所市茅原220-1 版No.1