

日本薬局方 ヨクイニン
 販売名：ヨクイニン ダイコー
 内容量：1 kg

袋表ラベル



第3類医薬品 日本薬局方

ヨクイニン

【用法及び用量】
 大人（15歳以上）は1日量30gを、水約600mLをもって煮て約400mLに煮つめ、かすをこして取り去り、食前または食間3回に分服する。
 （食間とは…食後2～3時間を指します。）

【効能又は効果】
 いぼ、皮ふのあれ

（裏面の「使用上の注意」などもよくお読みください。）

内容量 1 kg

Lot.



4 987716 189112

製造販売元
 名古屋市千種区松軒一丁目5番12号
大晃生薬有限公司

袋裏ラベル


使用上の注意
2

相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
 - (3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	胃部不快感
3. 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。…下痢
4. 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。
 （誤用の原因になったり品質が変わります。）
- (4) 開封後は、輪ゴムなどで封をして保管してください。