



大晃生薬印



大晃生

【用法及び用量】

大人（15歳以上）は1回量2g、1日3回、食前または食間に服用する。

（食間とは…食後2～3時間を指します。）

【効能又は効果】

いぼ、皮ふのあれ



内袋: PE, PET

（裏面の「使用上の注意」などもよくお読みください。）

第3類医薬品

日本薬局方

ヨクイニン末

内容量 500g

Lot.



4 987716 189259

大晃生薬有限公司

名古屋市千種区松軒一丁目5番12号

POWDER

保管及び取扱い上の注意

- (1)本品は吸湿してカビが生じたり虫がつく事がありますので、直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)開封後は、輪ゴムなどで封をして保管してください。

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願いいたします。

大晃生薬株式会社 試験室

電話:フリーダイヤル 0120-335064

受付時間:9時~12時,13時~17時

(土・日・祝日を除く)

副作用被害救済制度のお問い合わせ先

(独)医薬品医療機器総合機構

<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>

電話:フリーダイヤル 0120-149-931



使用上の注意

2

相談すること



1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
 - (3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	胃部不快感
3. 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。…下痢
4. 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 開封後は、輪ゴムなどで封をして保管してください。