

この添付文書は、本剤をご使用になる前に必ずお読みください。
また、必要なときにいつでも読めるよう保管しておいてください。

生薬煎剤

第2類医薬品

桔梗智辨 宝珠湯

ききょうちべん ほうしゅとう
桔梗智辨 宝珠湯は、收れん・止血作用のあるシユロジツ、利尿降圧・鎮痛作用のあるブクリヨウ・ボウイ・ソウジュツ、鎮痛作用のあるボウフウ・ウヤク・クレンピ・ボタンピ・シャクヤク・カンゾウを配合した生薬の煎じ薬です。

△ 使用上の注意

相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談してください。

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 妊婦または妊娠していると思われる人
- (3) 高齢者
- (4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
- (5) 次の症状のある人：むくみ
- (6) 次の診断を受けた人：高血圧、心臓病、腎臓病

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください。

- (1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。

- (2) 1カ月ぐらい服用しても症状がよくならない場合

3. 長期連用する場合には、医師、薬剤師または登録販売者に相談してください。

■ 効能・効果

脳溢血、血圧亢進、神経痛

■ 用法・用量

成人、1日1包、1包に水450mLを加え、270mLに煎じつめ、その煎液を1日3回に分け、食前に温めて服用してください。

(食前とは、食事のおよそ30分前をいいます。)

<用法・用量に関する注意>

- 1. 定められた用法・用量を厳守してください。
- 2. 15歳未満の小児には、服用させないでください。

<煎じ方>

生薬を紙袋に入ったままの状態で容器に入れ、水を加えて、とろ火で煎じつめてください。

注意 1. 中の紙袋は、そのまま煎じられるよう特殊な紙を使用しています。

紙袋を破って中の生薬を、直接、容器に入れることは避けてください。

2. 容器は土製、陶製のものがよく、鉄製のものは避けてください。

3. 加熱はとろ火で行い、急速に煮沸させるのは避けてください。

4. 煎じつめた後は、熱いうちに、紙袋を引き上げてください。

■ 成分・分量：1包(14g)中

ブクリヨウ(茯苓)	1g	シユロジツ(棕櫚実)	2g
ボウイ(防己)	2g	クレンピ(苦棟皮)	2g
ボウフウ(防風)	2g	ボタンピ(牡丹皮)	1g
ウヤク(烏藥)	1g	シャクヤク(芍藥)	1g
ソウジツ(蒼朾)	1g	カンゾウ(甘草)	1g

■ 保管および取扱い上の注意

- 1. 直射日光の当たらない、湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- 2. 小児の手の届かない所に保管してください。
- 3. 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり、品質が変わることがあります。)。

■ 問い合わせ先

チベン製薬株式会社 〒567-0073 大阪府茨木市西穂積町3番8号
電話：072-622-2509 FAX：072-625-6320