

ご使用に際して、この説明書を必ずお読みください。また必要なときに読めるように大切に保管しておいてください。

第3類医薬品

当芍参 錠

(とうしゃくさん)

起 源

中国の古い医典“金匱要略”に「当帰芍薬散」として収載され、やや虚弱な体質者の冷え症の漢方薬として昔から愛用されてきましたが、胃の弱い人の中にはまれに胃がもたれることがありました。これを防ぎ、服用しやすくするために、原方の当帰芍薬散に、人参、桂皮、甘草を加味し、錠剤に仕上げたものが「当芍参錠」です。

当芍参錠の適合する人

筋肉が軟らかく、腕の力が弱く、胴が細長い人。
顔の造作は細作りで、指も首も細く、声が小さい人。
熱いものを好み、食事量の少ない人が多い。

以上のような体質の人に当芍参錠は適合します。

製品の特徴

本剤は、直径約 7.4mm の灰褐色の素錠で、特有のにおいと味があります。



使用上の注意



相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談してください。
 - 医師の治療を受けている人。
 - 妊婦または妊娠していると思われる人。
 - 胃腸の弱い人。
 - 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - 次の成分を含有する内服薬などを服用している人。
センキュウ、タクシャ、ビャクジュツ、ブクリョウ、カンゾウ
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	はきけ、食欲不振、胃部不快感、腹痛

- しばらく服用しても症状がよくなりえない場合は服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください。

効能・効果

下腹腰脚冷込み、血色不良、下腹痛み、腰痛、更年期障害、月経不順、頭痛、めまい、のぼせ、肩こり

用法・用量

大人は1回に8錠ずつ、1日3回食前または食間に、水または白湯にて服用してください。
小児用量は、

14歳以下7歳まで 1回5錠 6歳以下5歳まで 1回4錠

また服用に際して、次のことに注意してください。

- 定められた用法、用量を厳守してください。
- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

成分・分量

本剤は大人1日の服用量24錠中に次の成分を含んでいます。

日局ト ウ キ	0.5g	日局ブ ク リ ョ ウ	0.6g
日局セ ン キ ュ ウ	0.3g	日局ニ ン ジ ン	0.4g
日局シ ャ ク ヤ ク	1.0g	日局ケ イ ヒ	0.3g
日局タ ク シ ャ	0.6g	日局カ ン ゾ ウ	0.2g
日局ビャクジュツ	0.6g		

保管および取り扱い上の注意

- (1) お子さまの手のとどかない所に保管してください。
- (2) 品質を保つため、直射日光をさけ、涼しい所に保管してください。
- (3) 誤った用い方をさけ、品質を保つために、他の容器に入れかえないでください。

その他

- 本剤は生薬（薬用の草根木皮など）を原料とした薬ですので、製品により、錠剤の色調などが多少異なることがあります。効能・効果にかわりありません。
- 長い間保存していて、再び服用される場合は、薬が湿っていないか、不快なおいがないか、虫害がないかなどをよく確かめてから、服用してください。

本剤について、何かお気づきの点がございましたら、お買い求めのお店または下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

長倉製薬株式会社 ☎06-6652-5000

受付時間 9:00～17:00（土、日、祝日を除く）

製造販売元



長 倉 製 薬 株 式 会 社

大 阪 市 西 成 区 聖 天 下 1-7-16

長倉の漢方薬