

ご使用に際して、この説明書を必ずお読みください。また必要なときに読めるように大切に保管しておいてください。

第3類医薬品

# ヨクイニン錠

## 製品の特徴

本剤は、微黄白色または淡黄白色で、においはなく、わずかに甘味があり、かみくだと歯間に粘着します。



## 使用上の注意

### 相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談してください。
  - 医師の治療を受けている人。
  - 妊婦または妊娠していると思われる人。
  - 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	胃部不快感

- 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続または増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください。

下痢
- 1ヶ月くらい服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください。

## 効能・効果

利尿、サメハダ、いぼ、神経痛

## 用法・用量

大人は1回に5錠ずつ、1日3回食前または食間に、水または白湯にて服用してください。小児用量は、

15歳以下8歳まで 1回3錠      4歳以下2歳まで 1回1錠

7歳以下5歳まで 1回2錠

また服用に際して、次のことに注意してください。

- 定められた用法、用量を厳守してください。
- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- 幼児に服用させる場合には、薬剤がのどにつかえることのないよう、よく注意してください。

### 成分・分量

本剤は大人1日の服用量15錠中に次の成分を含んでいます。

日局ヨクイニン	3.0 g
日局ステアリン酸マグネシウム	0.15 g

### 保管および取り扱い上の注意

- (1) お子さまの手のとどかない所に保管してください。
- (2) 品質を保つため、直射日光をさけ、涼しい所に保管してください。
- (3) 誤った使い方をさけ、品質を保つために、他の容器に入れかえないでください。

### その他

- 本剤は生薬（薬用の草根木皮など）を原料とした薬ですので、製品により、錠剤の色調などが多少異なることがあります。効能・効果にかわりありません。
- 長い間保存していて、再び服用される場合は、薬が湿っていないか、不快なおいがないか、虫害がないかなどをよく確かめてから、服用してください。

本剤について、何かお気づきの点がございましたら、お買い求めのお店または下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

長倉製薬株式会社 ☎06-6652-5000

受付時間 9:00～17:00（土、日、祝日を除く）

製造販売元



長倉の漢方薬

長倉製薬株式会社

大阪市西成区聖天下 1-7-16