

第2類医薬品

日本薬局方

ホリエ

カンゾウ

内容量 500g

Lot.

使用期限



4 969107 211725

製造販売元



堀江生薬株式会社

奈良県大和郡山市今国府町367-1

日本薬局方 カンゾウ

第2類医薬品

△(使用上の注意)

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)
短期間の服用にとどめ連用しないでください。

相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
 - (3) 高齢者
 - (4) 次の症状のある人 むくみ
 - (5) 次の診断を受けた人 高血圧、心臓病、腎臓病
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症状
偽アルドステロン症 ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。

3. 5～6回服用しても症状がよくなりえない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

(効能又は効果)

激しい咳、咽喉痛の緩解

(用法・用量)

大人(15歳以上)は1日量5gを、水約600mLをもって煮て約400mLに煮つめ、滓をこして取り去り、食前または食間3回に分服する。
定められた用法・用量を厳守してください。

(保管及び取扱い上の注意)

- (1) 直射日光をさけ、湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3) 誤用をさけ、品質を保持するために他の容器に入れかえないでください。
- (4) 本品は天然物でその性質上、吸湿してカビが生えたり虫づくことがありますので、開封後の保管に充分ご注意ください。
ご購入の時点で万一この様な異常がありましたらお手数ですがご一報をお願いします。

副作用被害救済制度

電話：0120-149-931