

げんのしょうこ

第3類医薬品


〈用法・用量に関連する注意〉

(1) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

(2) 煎じ方

水約600mLの中へ2包を入れ、軽く泡立つ程度の弱火で約400mL(10～15分)に煎じて火を止め、袋を取り出してください。

この約400mLを1日3回食前または食間に分けて服用してください。



成分・分量

1日量2包(10g)中、次の成分を含有する。

成分	1日量2包(10g)中
日本薬局方ゲンノショウコ	10g

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。
(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4) 使用期限をすぎたものは服用しないこと。


内容量

5g×20包(100g)

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。
本草製薬株式会社 お客様相談室
〒468-0046 名古屋市天白区古川町125番地
電話：052-892-1287(代表)
受付時間：9：00～17：00(土、日、祝日を除く)

【副作用被害救済制度のお問い合わせ先】
(独)医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
電話 0120-149-931(フリーダイヤル)

本草製薬株式会社
名古屋市天白区古川町125番地



*2012年7月改訂(記載要領変更に伴う改訂)

服用に際して、この説明書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

第3類医薬品

整腸薬

本草ゲンノショウコ(分包)5

日本薬局方 ゲンノショウコ

⚠ 使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
医師の治療を受けている人。
2. 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

効能・効果

整腸(便通を整える)、腹部膨満感、軟便、便秘

用法・用量

大人(15歳以上)は、1日量2包(10g)を水約600mLをもって煮て約400mLに煮つめ滓をこして取り去り食前または食間3回に分服する。

11歳以上	15歳未満	大人の2/3量
8歳以上	11歳未満	大人の1/2量
5歳以上	8歳未満	大人の1/3量
3歳以上	5歳未満	大人の1/4量
1歳以上	3歳未満	大人の1/5量
3ヵ月以上	1歳未満	大人の1/10量

げんのしょうこ

第3類医薬品


〈用法・用量に関連する注意〉

(1) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

(2) 煎じ方

水約600mLの中へ2包を入れ、軽く泡立つ程度の弱火で約400mL(10～15分)に煎じて火を止め、袋を取り出してください。

この約400mLを1日3回食前または食間に分けて服用してください。



成分・分量

1日量2包(10g)中、次の成分を含有する。

成分	1日量2包(10g)中
日本薬局方ゲンノショウコ	10g

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。
(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4) 使用期限をすぎたものは服用しないこと。

内 容 量

5g×22包(110g)

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。
本草製薬株式会社 お客様相談室
〒468-0046 名古屋市天白区古川町125番地
電 話：052-892-1287(代表)
受付時間：9：00～17：00(土、日、祝日を除く)

【副作用被害救済制度のお問い合わせ先】
(独)医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
電 話 0120-149-931(フリーダイヤル)

本草製薬株式会社
名古屋市天白区古川町125番地



*2012年7月改訂(記載要領変更に伴う改訂)

服用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

第3類医薬品

整 腸 薬

本草ゲンノショウコ(分包)5

日本薬局方 ゲンノショウコ

⚠ 使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
医師の治療を受けている人。
2. 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

効能・効果

整腸(便通を整える)、腹部膨満感、軟便、便秘

用法・用量

大人(15歳以上)は、1日量2包(10g)を水約600mLをもって煮て約400mLに煮つめ^{かす}滓をこして取り去り食前または食間3回に分服する。

11歳以上	15歳未満	大人の2/3量
8歳以上	11歳未満	大人の1/2量
5歳以上	8歳未満	大人の1/3量
3歳以上	5歳未満	大人の1/4量
1歳以上	3歳未満	大人の1/5量
3ヵ月以上	1歳未満	大人の1/10量