

服用前にこの説明書を必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるよう保管してください。

# 本草ヨクイニン錠S

第3類医薬品 〈生薬製剤〉

## ⚠ 使用上の注意



### 相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください  
(1)医師の治療を受けている人。  
(2)妊婦又は妊娠していると思われる人。  
(3)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	胃部不快感

- 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください  
下痢
- 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

効能、用法・用量、成分、保管及び取扱い上の注意については、裏面をよくご覧ください。

## 効能

いぼ・皮膚のあれ

## 用法・用量

次の量を食間又は食前に水又はぬるま湯で服用してください。

年齢	1回量	服用回数
15才以上	6錠	1日3回
11才～14才	4錠	
8才～10才	3錠	
5才～7才	2錠	
5才未満	服用しないこと	

食間の服用は、食事の後2～3時間を目安にします。

### 【注意】

- (1)定められた用法・用量を厳守してください。
- (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (3)ぬれた手等で触れた錠剤はびんに戻さないでください。  
(変色等の原因となり、品質が変わることがあります)

### 最初に服用する時に

詰め物を取り出して捨ててください。

(この詰め物は輸送時の錠剤の破損を防ぐためのものです。これをびんに出し入れすると、異物混入の原因になることがあります)

## 成分

1日量(18錠)中

ヨクイニン末……………4,200mg

添加物：二酸化ケイ素

### 【注意】

本剤は、生薬を用いた製剤ですから、製品により色が多少異なることがあります。効果には変わりありません。

## 保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)
- (4)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。なお、使用期限内であっても、開封後はなるべく早く服用してください。(品質保持のため)

この製品についてのお問い合わせは、下記に  
お願い申し上げます。

**連絡先** 大正製薬株式会社 お客様119番室

**電話** 03-3985-1800

**受付時間** 8:30～21:00(土、日、祝日を除く)

発売元 11

**大正製薬株式会社**

東京都豊島区高田3丁目24番1号

<https://www.taisho-direct.jp/>

製造販売元

**本草製薬株式会社**

名古屋市天白区古川町125番地

## 副作用被害救済制度のお問い合わせ先

(独)医薬品医療機器総合機構 [https://www.pmda.go.jp/kenkouhigai\\_camp/index.html](https://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html)

電話：0120-149-931(フリーダイヤル)