

日本薬局方

山本漢方  
よくいんにん  
「分包」

いぼ、皮膚のあれ

簡単、便利な

ティーバッグタイプです。

ヨクイニン

Q.P ヨクイニン

YAMAMOTO

第3類医薬品

あけくち

日本薬局方

# ヨクイニン

販売名 山本漢方よくいにん

## 【特徴】

本品は生薬の煎じ薬、ティーバッグタイプ

## △ 使用上の注意

### 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
  - (1) 医師の治療を受けている人。
  - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
  - (3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	胃部不快感

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください  
下痢

4. 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

製造販売元

山本漢方製薬株式会社

愛知県小牧市多気東町156番地

お客様相談窓口

山本漢方製薬株式会社

〒485-0035 愛知県小牧市多気東町156番地

電 話 0568-73-3131

受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

<https://www.kanpo-yamamoto.com>

副作用被害救済制度 ☎ 0120(149)931

ご使用に際して、この説明文を必ずお読みください。また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

第3類医薬品

## 効能又は効果

いぼ、皮膚のあれ

## 用法及び用量

年 齢	1回量	服用回数
大人 (15歳以上)	10gの煎液 の1/3	1日3回を限度とする。

大人(15歳以上)は、1日量10g(1包)を、水約600mLをもって煮て、約400mLに煮つめ、滓(カス)を取り去り、食前又は食間3回に分服する。

〈注意〉

定められた用法及び用量を厳守してください。

## 成分及び分量 1日量 1包(10g)中

成 分	分量	作 用
日本薬局方 ヨクイニン	10g	民間薬として、いぼや肌あれに服用する。

## 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

## 【その他】

### ○ヨクイニンの煎じ方(大人15才以上)

土ビンかヤカン(アルミ、ステンレス製)にて水約600mLの中に本品1包を入れ、中の煎剤が軽く泡立つ程度の弱火にて、水が約400mLとなるまで(10分~15分)煎じて、火を止め袋を取り出してください。

### ○本品を煎じた後の保管

夏期は、長時間煎液を放置しますと、腐敗する恐れもありますので、煎液は冷蔵庫に保管してください。

## ヨクイニン豆知識

果実は皮付きのものをハトムギといい、殻と薄い皮(えい)を除去し精白したものを薏苡仁(ヨクイニン)と言います。これを植物的に説明すると、堅い殻は総包であって、これを包鞘といい、この中で子房が生長しこの果実のことを穎果と言います。したがって包鞘に包まれた全体は偽果ということになります。

(穎果“えい果”とは果皮が乾燥して堅くなり種皮と合着して離れず中の種子は一個の果実となるものです。イネ科植物の特性で穀果ともいいます。)

### 形態

ヨクイニンは草丈1.5mぐらいに達する一年生草本です。ひげ根は太く、茎は太くて分枝し、緑色で光沢があり毛はありません。稈には10数の節があり中空です。果実は成熟するにしたがって包鞘がやや堅くなり黒褐色あるいは暗褐の楕円形となります。果実は9月から10月にかけて徐々に成熟し、放置しておくとも、成熟したものから自然に落下します。すなわち原始的なイネ科の植物の特性を持っています。