

ご使用に際して、この説明書を必ずお読みください。また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

第3類医薬品

日本薬局方
ヨクイニン末

販売名 山本漢方ヨクイニン末

【特 徴】

本品は生薬のみからなる散剤です。

△ 使用上の注意

■ 相対すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	胃部不快感

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください 下痢

4. 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

日本薬局方

ヨクイニン末

皮膚のあれ、いぼに

YOKUININ
肌あれ

粉末 100%

粉末なので、服用が簡単です。

第3類医薬品

山本漢方製薬

効能又は効果

皮膚のあれ、いぼ

用法及び用量

年 齢	1回量	服用回数
大人 (15歳以上)	2.0g	1日3回を限度とする。

大人(15歳以上)は、1回量2g、1日3回、食前又は食間に水又はお湯にて服用してください。1回量は添付のサジ約1杯です。

〈注意〉

定められた用法及び用量を厳守してください。

成分及び分量 1日量 6g中

成 分	分量	作 用
日本薬局方 ヨクイニン末	6.0g	いぼや肌あれに 服用する。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4) 使用期限の過ぎた製品は服用しないでください。

【その他】

服用しづらい方は、オブラートに包み服用するか、お湯又は水の中に粉末を入れしばらく浸し、ダマがなくなるまでよくかき混ぜて、服用してください。

ヨクイニン豆知識

日本の各地の畑に栽培される1年生のイネ科の植物。最近では東南アジアで栽培されたものが多く輸入され、殻のついたものはハトムギといわれ、ヨクイニンとは脱穀し精麦したものをいう。

製造販売元

山本漢方製薬株式会社
愛知県小牧市多気東町156番地

お客様相談窓口

山本漢方製薬株式会社
〒485-0035 愛知県小牧市多気東町156番地
電 話 0568-73-3131
受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)
<https://www.kanpo-yamamoto.com>

副作用被害救済制度 ☎0120(149)931