

YAMAKAN

チャック

薏米

ヨクイニン

ハトムギ錠

効能・効果

肌あれ、
いぼに

第3類医薬品

山本漢方製薬



切り取り線

開封後はチャックをしっかりと閉めてください

チャック

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要なとき読めるよう大切に保管してください。

販売名：
山本漢方ハトムギ錠

第3類医薬品

【特徴】

本品は「いぼ、皮膚のあれ」に効果があるヨクイニン末を服用しやすい錠剤としたものです。生薬のヨクイニン末は固めにくく、やわらかい錠剤となっています。

⚠ 使用上の注意

相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
 - 医師の治療を受けている人。
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	胃部不快感

- 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
下痢

- 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

効能又は効果

いぼ、皮膚のあれ

用法及び用量

次の量を1日3回、食前又は食間に水または白湯で服用してください

年齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	6錠	3回
11歳以上15歳未満	4錠	
8歳以上11歳未満	3錠	
5歳以上8歳未満	2錠	
5歳未満	服用しないでください。	

〈用法・用量に関連する注意〉

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

成分及び分量 1日量18錠(成人の1日服用量)中

成分	分量
日本薬局方ヨクイニン末	3000mg
ヨクイニンエキス	231mg(日局ヨクイニン3gに相当)

添加物として、部分アルファー化デンプン、結晶セルロース、含水二酸化ケイ素、メタケイ酸アルミン酸マグネシウム、ステアリン酸マグネシウムを含有します。

保管及び取り扱い上の注意

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に、チャックをしっかりと閉めて保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- 使用期限を過ぎたものは服用しないでください。
- 水分が錠剤につきまると、変色または色むらを生じることがありますので、誤って水滴を落としたり、濡れた手で触れないでください。

お客様相談窓口

山本漢方製薬株式会社

〒485-0035 愛知県小牧市多気東町156番地
電話 (0568)73-3131
受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日は除く)
ホームページアドレス <http://www.kanpo-yamamoto.com>

製造販売元

山本漢方製薬株式会社

愛知県小牧市多気東町156番地

副作用被害救済制度 ☎ 0120(149)931

Natural Life
Support

チャック

薏米




ヨクイニン

ハトムギ錠

効能・効果

肌あれ、いぼに



第3類医薬品

山本漢方製薬



チャック

切り取り線

開封後はチャックをしっかり閉めてください

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要なとき読めるよう大切に保管してください。

販売名：
山本漢方ハトムギ錠

第3類医薬品

【特徴】

本品は「いぼ、皮膚のあれ」に効果があるヨクイニン末を服用しやすい錠剤としたものです。生薬のヨクイニン末は固めにくく、やわらかい錠剤となっています。

△ 使用上の注意

相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
 - 医師の治療を受けている人。
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	胃部不快感

- 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
下痢

- 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

効能又は効果

いぼ、皮膚のあれ

用法及び用量

次の量を1日3回、食前又は食間に水または白湯で服用してください

年齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	6錠	3回
11歳以上15歳未満	4錠	
8歳以上11歳未満	3錠	
5歳以上8歳未満	2錠	
5歳未満	服用しないでください。	

〈用法・用量に関連する注意〉

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

成分及び分量 1日量18錠(成人の1日服用量)中

成分	分量
日本薬局方ヨクイニン末	3000mg
ヨクイニンエキス	231mg(日局ヨクイニン3gに相当)

添加物として、部分アルファー化デンプン、結晶セルロース、含水二酸化ケイ素、メタケイ酸アルミン酸マグネシウム、ステアリン酸マグネシウムを含有します。

保管及び取り扱い上の注意

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に、チャックをしっかり閉めて保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- 使用期限を過ぎたものは服用しないでください。
- 水分が錠剤につきまると、変色または色むらを生じることがありますので、誤って水滴を落としたり、濡れた手で触れないでください。

お客様相談窓口

① 山本漢方製薬株式会社

〒485-0035 愛知県小牧市多気東町156番地
電話 (0568)73-3131
受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日は除く)
ホームページアドレス <https://www.kanpo-yamamoto.com>

製造販売元

① 山本漢方製薬株式会社

愛知県小牧市多気東町156番地

副作用被害救済制度 ☎0120(149)931