

ご使用に際して、この説明書を必ずお読み下さい。また、必要な時に
読めるように大切に保存して下さい。

*印：2020年11月改訂

コフロンエース

第②類医薬品

本剤は一般咳、小児喘息、呼吸が苦しくなる気管支喘息などの咳嗽症に優れた効果をあらわします。

* ⚠ 使用上の注意

 してはいけないこと (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる。)

1. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないこと。

 他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、鎮静薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等)

相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

- | | |
|-----------------------|-------------------------------|
| (1) 医師の治療を受けている人。 | (4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。 |
| (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。 | (5) 次の症状のある人。 : 高熱、むくみ |
| (3) 高齢者。 | (6) 次の診断を受けた人。 : 心臓病、高血圧、腎臓病 |

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診察を受けること。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症、 ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。

3. 5～6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

4. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

効能・効果 感冒、気管支炎、咽喉炎、喘息などの鎮咳去痰

用法・用量 1日2～3回服用。大人1回10mL、15～8歳は1回5mL、7～5歳は1回3mL、4～2歳は1回1mL。(添付のコップで計量する。)

用法および用量に関する注意

- (1) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。
- (2) 2歳未満には服用させないこと。

成分・分量

(1日量 30mL中) 軟エキス……………3,600mg
{ マオウ 5g、キョウニン 4.5g、カンゾウ 3.5g }
{ セッコウ 15g、キキョウ 5g、パイモ1g }
プラントール(車前草 3.3g)……………500mg
添加物として白糖、デヒドロ酢酸ナトリウムを含有する。

保管及び取扱い上の注意

- | | |
|---|---|
| (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管すること。 | (4) 本剤は沈殿を生じてても薬効に影響はありません。よく振ってから服用すること。 |
| (2) 小児の手の届かない所に保管すること。 | (5) 開栓後は冷暗所に保存すること。 |
| (3) 他の容器に入れ替えないこと。
(誤用の原因になったり品質が変わる。) | (6) 使用期間(外箱に記載)の過ぎたものは使用しないこと。 |

本剤をご使用になられて、変わった症状があらわれるなど、何かお気づきの点がございましたら、お買求めのお店又は下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

製造販売元

有限会社 日本漢方医薬研究所

徳島県鳴門市北灘町榎木字ノ尻89-7

電話：088-666-0678

ホームページ：<http://nihonkampo.com/>

受付時間：10:00～17:00(土、日、祝日を除く)