

KOJIMA'S
HERB MEDICINE

日本薬局方

ヨクイニン

第3類医薬品

500g

製造販売元



株式会社 **小島漢方**

大阪市中央区常盤町2-2-19

TEL 06-6941-1643



LOT.NO.

ヨクイニン

用法及び用量

大人(15歳以上)は1日量30gを、水約600mlをもって煮て約400mlに煮つめ、滓をこして取り去り、食前または食間3回に分服する。

(用法・用量に関する注意)
用法・用量を厳守してください。

効能又は効果

いぼ、皮膚のあれ

⚠️ 使用上の注意

相談すること



- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - 医師の治療を受けている人
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	消化器	皮 膚
症 状	腹 痛	発 疹

- 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

下痢

- 3ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

□保管及び取扱い上の注意

- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 直射日光を避け、湿気の少ない涼しい場所に保管してください。
- 本品は天産品ですので、吸湿してカビ・虫害等の発生する恐れがあります。保管には十分ご注意ください。
- 誤用を避け、品質を保持するため他の容器に入れ替えないでください。
- 本品には品質保持(カビ・虫害防止)のため季節により脱酸素剤を入れる事があります。開封後は高温多湿を避け、なるべくお早めにご使用ください。
- 脱酸素剤はお召し上がりなきようお願い致します。

本品を煎じた後の保管

夏期は、腐敗する恐れもありますので、煎液は冷蔵庫に保管してください。

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

お問い合わせ先

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願いします。

株式会社 小島漢方

TEL 06-6941-1643