

日本薬局方

ヨクイニン末

Lot. 810202P

第3類医薬品



■用法及び用量

大人（15歳以上）は1回量2g、
1日3回、食前または食間に
服用する。

〈用法・用量に関する注意〉

用法・用量を厳守してください。

■効能又は効果

いぼ、皮膚のあれ

（添付のサジすり切り一杯約1.0g）

副作用被害救済制度のお問い合わせ先
（独）医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
電話 0120-149-931（フリーダイヤル）

お問い合わせ先

本品についてのお問い合わせは、
お買い求めのお店又は下記に
お願いします。
株式会社 小島漢方
TEL 06-6941-1643

日本薬局方

ヨクイニン末

第3類医薬品

500g

製造販売元

株式会社 小島漢方

大阪市中央区常盤町2-2-19
TEL 06-6941-1643

■保管及び取り扱い上の注意

- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 直射日光を避け、湿気の少ない涼しい場所に保管してください。
- 本品は天産品ですので、吸湿してカビ・虫害等の発生する恐れがあります。保管には十分ご注意ください。
- 誤用を避け、品質を保持するため他の容器に入れ替えないでください。
- 本品には品質保持（カビ・虫害防止）のため季節により脱酸素剤を入れる事があります。開封後は高温多湿を避け、なるべくお早めにご使用ください。
- 脱酸素剤はお召し上がりなきようお願い致します。



4 993512 750234

⚠ 使用上の注意

相談すること



1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
①医師の治療を受けてる人
②妊婦又は妊娠していると思われる人
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	消化器	皮膚
症状	腹痛	発疹

3. 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
下痢
4. 3ヶ月位服用しても症状がよくなりえない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

