

第3類医薬品

日本薬局方 ヨクイニン トチモトのヨクイニンP

薏苡仁 500g



製造番号
使用期限

相談すること

【使用上の注意】

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1) 医師の治療を受けている人。(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるため、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮膚(ひふ)	発疹・発赤、かゆみ
消化器	胃部不快感

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください 下痢
4. 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

【効能・効果】 いぼ、皮膚のあれ

【用法・用量】 大人(15歳以上)は1日量30gを、水約600mlをもって煮て約400mlに煮つめ、滓をこして取り去り、食前または食間3回に分服してください。
・定められた用法・用量を守り、正しくお使いください。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4) 煎液は腐敗を防ぐために冷所に保管してください。

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931

株式会社 杉本天海堂

【脱酸素剤入】

大阪市北区末広町3番21号 TEL 06(7711)0730

939030

第3類医薬品

日本薬局方ヨクイニン 北の大地のヨクイニン

＜北のはと 使用＞ 180g

【使用上の注意】

相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - 医師の治療を受けている人。
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮膚(ひび)	発疹・発赤、かゆみ
消化器	胃部不快感

- 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。 下痢
- 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

【効能・効果】

いぼ、皮膚のあれ

【用法・用量】

大人(15歳以上)は1日量30gを、水約600mlをもって煮て約400mlに煮つめ、汁をこして取り去り、食前または食間3回に分服してください。
*定められた用法・用量を守り、正しくお使いください。

*脱酸素剤入り

副作用被害救済制度
電話：0120(149)931

株式会社 橋本天彦堂

大阪市北区末広町3番21号
06(7711)0730

939032

【保管及び取扱い上の注意】

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に封をして保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- 煎液は腐敗を防ぐために冷所に保管してください。

*品質には細心の注意をはらっておりますが、お気づきの点がございましたら、弊社までご連絡ください。

製造番号

使用期限

