

第2類医薬品

店舗専用

哺乳びん・乳首の消毒、  
医療器具等の消毒に

次亜塩素酸ナトリウム 1.0w/v%

テキサント®P

500mL

● 本品は飲まないでください。

● 小児の手の届かない所に保管してください。

● 本品を取り扱う時は、ゴム手袋などをご使用ください。

まぜるな  
危険

酸性の洗浄・漂白剤、シアヌール酸系の製品と混合すると塩素ガスが発生して危険ですのでおやめください。

希釈方法 (消毒溶液1L調製時のテキサントPの必要量)

調製量	10倍液(0.1%)	20倍液(0.05%)	50倍液(0.02%)	80倍液(0.0125%)
1L	100mL	50mL	20mL	12.5mL

製造販売元 シオガ製薬株式会社

兵庫県尼崎市潮江3丁目1番11号

販 売

日本新薬株式会社

京都市南区吉祥院西ノ庄門口町14



## 使用上の注意 (使用前に必ずお読みください。)



### 相談すること

1. 本品は内服しないでください。また、あやまって飲み込んだ時は、すぐに水・生卵・ミルク等を飲み、医師に相談してください。
2. 目に入らないよう注意してください。目に入った場合には、こすらずにすぐに水又はぬるま湯で十分に洗い流してください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
3. 本品の使用により、手の荒れ、発疹・発赤、かゆみ等の症状があらわれた場合には、使用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

## 効能・効果、用法・用量

効能・効果	用法・用量
哺乳びん・乳首の消毒	哺乳びん・乳首を洗浄、水洗いした後、本剤の80倍液に1時間以上浸す。
医療器具の消毒	本剤の20~50倍液に数分間浸すか、清拭する。
器具・物品などの消毒	本剤の20~50倍液に数分間浸すか、清拭する。
室内・便所・浴室の消毒	本剤の20~50倍液で清拭する。
排泄物の消毒	本剤の1~10倍液を用いる。



ボトル:PE  
キャップ:PP

®:登録商標

## 用法及び用量に関する注意

1. 定められた用法・用量を厳守してください。(排泄物の消毒時以外は、原液での使用を避けてください。また、熱湯での希釈は避けてください。)
2. 酸性の洗浄・漂白剤、シアヌール酸系の製品と混合すると塩素ガスが発生して危険ですので混合しないでください。
3. 金属製の容器又は製品(スプーン等)は、変質する可能性がありますので、使用しないでください。化学繊維、皮革、毛、絹製品への使用も避けてください。
4. 調製後、消毒溶液が変色した場合、その水での調製を避けてください。

成分・分量 次亜塩素酸ナトリウム 1.0w/v%

## 保管及び取扱い上の注意

1. 直射日光を避け、なるべく湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
2. 誤用を避け、品質を保持するため他の容器に入れかえないでください。
3. 衣類等につくと脱色、変質する可能性がありますので、注意してください。
4. 紙菌消毒する製品によっては印刷面、材質などを変色(変質)する場合があるので注意してください。



4

製品に関するお問い合わせ先

電話(06)6470-2102

受付時間: 9:00~17:30

(土、日、祝日を除く)

製造番号

使用期限