

殺菌消毒薬

ジクロシア®

ジクロルイソシアヌール酸ナトリウム製剤
500g

発売元

ヨシダ"製薬"

吉田製薬株式会社
東京都中野区中央5-1-10

製造販売元

日産化学株式会社

東京都中央区日本橋二丁目5番1号

殺菌消毒薬

ジクロシア®

500g

まぜるな危険 酸性の洗浄・漂白剤、シアヌール酸系の製品と混合すると塩素ガスが発生して危険ですのでおやめください。

- ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
- 本品は飲まないでください。
 - 手の荒れやすい方は、取扱い時に炊事用手袋などをご使用ください。

【使用上の注意】

相談すること

1. 本品をあやまって飲み込んだ時は、すぐに水、生卵、ミルク等を飲み、この製品を持って医師に相談してください。
2. 目に入らないように注意してください。目に入った場合には、こすらずにすぐに水又はぬるま湯で十分に洗い流してください。なお、症状が重い場合には、この製品を持って眼科医に相談してください。
3. 本品の溶液との接触により、手の荒れ、発疹、発赤、かゆみ等の症状があらわれた場合には使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

【効能・効果、用法・用量】

効能・効果	用法・用量
哺乳びん・乳首 の消毒殺菌	水2L当たり本品1gを溶かした液に1時間以上浸す。
医療器具 の消毒	水1L当たり本品1~2gを溶かした液に数分間浸すか、清拭する。
器具・物品など の消毒	水1L当たり本品1~2gを溶かした液に数分間浸すか、清拭する。
室内・便所・ 浴室の消毒	水1L当たり本品1~2gを溶かした液で清拭する。

(本品1g:添付のスプーン1杯)

(用法・用量に関する注意)

1. 定められた用法・用量を厳守してください。
2. 換気のよい場所で使用してください。
3. 液体タイプの塩素系洗浄・漂白剤、酸性の洗浄・漂白剤等との混合は危険ですので避けてください。
4. 金属製の容器は用いないでください。また、哺乳びんパサミ、スプーン等の金属製品や、指輪等貴金属を本品の溶液につけることも避けてください。メラミン食器等には、本品の使用を避けてください。
5. 調製後、本品の溶液が変色した場合、その水での調製を避けてください。

【成分及び分量】

本品1g中 ジクロルイソシアヌール酸ナトリウム 500mg、添加物として、炭酸水素ナトリウム、コハク酸を含む。

【保管及び取扱い上の注意】

1. 直射日光の当たらぬ温氣の少ない涼しい所に保管してください。
2. 小児の手の届かないところに保管してください。
3. 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になつたり品質が変わる)
4. 衣類等につくと脱色、変色することがありますので注意してください。
5. 殺菌消毒する製品によっては印刷面(文字、絵)、材質など変色・変質することがあります。



お問い合わせ先
吉田製薬株式会社 お客様相談室
東京都中野区中央5-1-10
TEL.03-3381-2004
受付時間9:00~17:00
(土、日、祝日を除く)



製造番号

使用期限

01