



混合禁止 子供注意

保管及び取扱い上の注意 (本剤は強力な酸化剤です。保管及び取扱いにはご注意ください。)

- (1) 本剤は入居(浄化槽使用開始)前には開封しないでください。入居前に開封しますと塩素ガスの発生により金属等を腐食させる恐れがあります。
- (2) 火気、熱(機械室、ボイラー室等)、直射日光、水滴れを避けて、湿気のない涼しい場所に保管してください。
- (3) 子供の手の届かないところに保管してください。
- (4) 火災時には本剤を現場から遠ざけて類焼を避けてください。消火の場合は、大量の水をかけてください。

廃棄の方法 処分する場合は、販売店にお問い合わせください。

- (5) 火災や汚染の原因になるため、ごみ箱やごみ捨て場に捨てないでください。河川への投棄は絶対に避けてください。
- (6) 取扱い時は、手袋、マスク、ゴーグルなどの保護具を着用してください。
- (7) 金属を腐食しますので使用する器具等は、樹脂製の材質をお選びください。
- (8) 識別できなくなったり、誤って使用する恐れがあるため、他の容器への詰替えは避けてください。

四国化成工業株式会社 (お問い合わせ先)
有機化成品営業部 TEL 043-296-1665
(平日10:00~16:30) TEL 06-6380-4112

国産番号 2468 指針番号 140

更新日 2023.01.01



イソシアヌル酸系

混合禁止

入居前の開封禁止

第2類医薬品

浄化槽用殺菌・消毒剤
ポンシロール
L-90

製造販売業者

四国化成工業株式会社

徳島県板野郡北島町江尻字内中須1番地
本社 香川県丸亀市土器町東8丁目537番地1

Lot No.

第2類医薬品

浄化槽用殺菌・消毒剤
ポンシロール
L-90

成分及び分量 本品1錠(50g)中、トリクロロイソシアヌル酸49.73gを含有する(添加物として3成分含有) 内容量 50g×6錠

効能又は効果 し尿浄化槽及び汚水(合併)処理施設の放流水の殺菌・消毒

用法及び用量 [し尿浄化槽用]し尿浄化槽放流水2.22~2.96mlにつき、本品1錠(50g)を浄化槽の消毒槽あるいは浄化槽放流水の放流床に投与することにより、し尿浄化槽放流水の殺菌・消毒ができます。
[汚水(合併)処理用]汚水(合併)処理施設放流水4.41~8.65mlにつき、本品1錠(50g)を処理施設の消毒槽あるいは処理施設放流水の放流床に投与することにより、汚水(合併)処理施設放流水の殺菌・消毒ができます。

使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。また必要な時に読めるようにしてください。

使用上の注意

△してはいけないこと (守らないと重大な事故につながります)

- 混合禁止
本品は強力な酸化剤です。
- (1) 次亜塩素酸カルシウム(ハイクロン、トヨクロン、スタークロン、高度さらし粉)、次亜塩素酸ソーダとの直接混合での使用は絶対に避けてください。急激な塩素ガスの発生や爆発を起します。
- (2) 酸、脱塩素剤(チオ硫酸ナトリウム、亜硫酸ナトリウム等)、油脂類、グリース類、その他可燃物とは直接触れないようにしてください。急激に反応して有毒ガス(塩素ガス、亜硫酸ガス、硫化水素等)が発生し、爆発・発火することがあります。

相談すること (次の場合は、直ちに使用を中止し、この文書または製品を持って医師に相談してください)

- (1) 本剤を絶対に飲み込まないでください。誤って飲み込んだり、吸入したときは、直ちにこの文書または製品を持って医師に相談してください。
- (2) 本剤が眼に入らないように注意してください。もし眼に入った場合は、直ちに流水(大量の水)で十分に洗眼し、直ちに医師に相談してください。
- (3) 本剤が皮膚または衣類に付着したときは、直ちに払い落として、水で十分に洗浄してください。皮膚を刺激し、衣服を染色させることがあります。皮膚刺激症状があらわれた場合には、医師に相談してください。

こちら側のどこからでも切れます