


NISSAN

蚊・蝇・ゴキブリ 殺虫剤

ニッサンプレート18B

第1類医薬品



PLATE

日産化学株式会社

2018年7月改訂

●ご使用に際して、この製品表示を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるように大切に保管してください。

蒸散性殺虫剤(1枚入り) 第1類医薬品
ニッサンプレート18Bは下水槽・浄化槽・ごみ箱などに発生する蚊・ハエ・ゴキブリを吊るしておくだけで駆除する持続性のある蒸散性殺虫剤です。長時間にわたり一定濃度で徐々に空気中に発散しますので、有効期間が長く2~3ヶ月に1度交換するだけで、蚊・ハエ・ゴキブリに殺虫効力を発揮します。
「注意 一 人体には使用しないこと」

⚠ <使用上の注意>

☒ してはいけないこと
(守らないと副作用・事故が起こりやすくなる)
以下の場所では使用しないこと。
(1) 居室(客室、事務室、教室、病室を含む)、居室にある戸棚・キャビネット内 (2) 飲食する場所(食堂など)、飲食物が露出している場所(調理場、食品倉庫、食品加工場など)



相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談すること。
薬や化粧品等によりアレルギー症状(例えば発疹・発赤・かゆみ・かぶれ等)を起こしたことがある人
2. 使用開始後、次の症状が現れた場合は、副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って、医師又は薬剤師に相談し、本剤が有機リン系の殺虫剤であることを告げること。

関係部位	症 状
精神神経系	頭痛、めまい
消化器	腹痛、下痢、吐き気、嘔吐
その他	全身のだるさ、多汗

本剤の解毒剤としては、ブライドキシム(PAM)製剤及びアトロピン製剤が有効であると報告されている。

[用法及び用量に関する注意]

1. 定められた用法及び用量を厳守すること。2. 表面に少量の液体が付着することがあるので、目に入らないよう注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること。3. 小児や家畜動物とのどかない範囲で使用すること。4. 愛玩動物(小鳥、魚等)の直ぐそばに吊るすことは避けること。5. 飲食物、食器、小児のおもちゃ又は飼料等に直接触れないようにすること。6. 本剤を取り扱った後又は皮膚に触れた場合は、手や触れた部分の皮膚を石けんと水でよく洗うこと。7. 本剤を多量に、又は頻繁に取り扱う場合は、ゴム手袋を着用すること。8. 使用直前に開封し、有効期間そのまま吊り下げておくこと。9. 一度開封したら、必ず使用すること。

[保管及び取扱い上の注意]

1. 直射日光が当たらない、涼しい所に保管すること。2. 食品、食器、餌等と区別し、小児や愛玩動物の手等がとどかない所に保管すること。3. 不用になった包装は、プラスチックごみとして、市区町村の処理基準に従って適正に捨てること。4. 開封後、有効期間が過ぎ、効力がなくなった製品は、プラスチックごみとして市区町村の処理基準に従って適正に捨てること。

<効能又は効果> 力成虫、ハエ成虫、ゴキブリの駆除

<用法及び用量>

- (1) 本剤は、開封したのち下記の要領に従い使用すること。

使用場所	害虫種	使用量	使用法
以下の場合のうち、人が長時間留まらない区域: ホテル、旅館、工場、倉庫、テント、地下室、店舗	ハエ成虫 蚊成虫	25~30m ² の容積当たり 1枚	天井または壁から吊り下げる。
便所	ハエ成虫 蚊成虫	8~12m ² の容積当たり1枚	
下水槽 浄化槽	ハエ成虫 蚊成虫	5~10m ² の空間容積当たり 1枚	蓋、マンホールから、水面上20~30cmの高さに吊り下げる。
ゴミ箱 厨芥箱	ハエ成虫 ゴキブリ		上蓋の内側中央部に吊り下げる。または上蓋の内側に取り付ける。
戸棚 キャビネット	ゴキブリ		天井や容器の上側から吊り下げる。

- (2) 本剤は、開封後通常2~3ヶ月有効である。

- (3) 同一場所に2枚以上使用する場合は、少なくとも3m以上の間隔で吊り下げる。

<有効成分> ジクロロルボス(DDVP) 15.3g(内容量1枚85g)

<その他の成分> エチレン-酢酸ビニル共重合体、その他6成分

発売元

日産化学株式会社

東京都中央区日本橋二丁目5番1号

(お客様窓口)TEL:03-4463-8150

受付時間:9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

使用期限

製造販売元 中山工業株式会社

製造番号

埼玉県秩父郡小鹿野町小鹿野580番地

