

ご使用に際して、この説明書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

第2類医薬品

シラミ駆除医薬品

アース

シラミとり シャンプー



アース製薬株式会社 AQA

〒101-0048 東京都千代田区神田司町2-12-1
(お客様窓口) TEL 0120-81-6456
受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)
<http://www.earth-chem.co.jp>

[副作用被害救済制度のお問い合わせ先]
(独) 医薬品医療機器総合機構
TEL 0120-149-931 (フリーダイヤル)
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>

特長

- 人に寄生するシラミの駆除に優れた効果のある医薬品です。
- たっぷり柔らかな泡立ちと優しいフローラルの香りのシャンプータイプです。
- 手に取りやすく使いやすいシャンプーです。
- 片手で使いやすいワンタッチキャップ&スクイズボトルを採用しました。
- 濡れた髪をとかしやすい幅広タイプと、卵をスキ取ることが出来る幅狭タイプのW仕様のクシを添付しています。

⚠ 使用上の注意

してはいけないこと ❌ (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります。)

1. 次の場合は使用しないでください。
頭皮又は適用部位に湿疹、かぶれ、ただれ等の症状がある場合
2. 内服しないでください。
3. 頭髮の洗浄を目的として使用しないでください。

相談すること

1. 次の人は使用前に、医師又は薬剤師にご相談ください。
(1) 本人又は家族がアレルギー体質の人
(2) 薬や化粧品等によるアレルギー症状(発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等)を起こしたことがある人
2. 次の場合は直ちに使用を中止し、この説明書をもって医師又は薬剤師にご相談ください。
(1) ご使用后、皮ふに発疹・発赤、かゆみ、かぶれの症状があらわれた場合
(2) 3~4回使用しても改善が見られない場合
3. 次の場合は直ちに医療機関を受診してください。
(1) 誤って本剤をのみこんだ場合
(2) 誤って目に入り、水又はぬるま湯で洗い流した後も症状が重い場合

■ 効能又は効果

シラミの駆除

■ 用法及び用量

- (1) シラミが寄生している頭髮又は陰毛を水又はぬるま湯で予め濡らし、1回量(頭髮には10~20mL程度、陰毛には3~5mL程度)を取り、毛の生え際に十分にいきわたるように又全体に均等になるようにシャンプーしてください。
(※ボトルの目盛り(大目盛り:10mL、小目盛り:5mL)を目安に1回量を使用してください。)
- (2) シャンプーして5分間放置した後、水又はぬるま湯で十分に洗い流してください。
- (3) この操作を1日1回、3日に1度ずつ(2日おきに)3~4回繰り返してください。

■ 用法及び用量に関する注意

- (1) 用法及び用量を厳守してください。
- (2) 本剤は頭髮又は陰毛等、目的とする局所のみ使用し、局所以外の人体露出部には使用しないでください。
- (3) 使用に際して、目、耳、鼻、口、尿道、膣、肛門等に入らないように注意してください。万一目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗い流してください。
- (4) 本剤の使用後、手は水又はぬるま湯、石けん等で洗ってください。毛に固着した卵は、添付のすきぐし(専用クシ)を用いて取り除いてください。すきぐしは使用後、55℃以上のお湯に5分間以上浸漬し、付着した卵を殺卵してから再使用してください。
- (5) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (6) ヘアマニキュアなどで毛髪を染めている場合、本剤により染毛剤が溶け出して脱色されることがあります。
また、溶けた染毛剤で衣服などが汚れるおそれがありますので注意してください。
- (7) 食品、食器、おもちゃ、観賞魚等にかからないようにしてください。

■ 成分及び分量

有効成分:フェントリン0.4%

添加物としてプロピレングリコール、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、ヤシ油脂脂肪酸ジエタノールアミド、ラウリン酸ジエタノールアミド、ラウリル硫酸ナトリウム、塩化ナトリウム、エドト酸ナトリウム、パラオキシ安息香酸メチル、パラオキシ安息香酸プロピル、カラメル、無水クエン酸、香料を含有します。

■ 保管及び取扱い上の注意

- (1) 本剤はシラミ駆除専用の医薬品です。通常のシャンプー等と区別して保管し、頭髮の洗浄の目的には使用しないでください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 直射日光の当たらない、涼しい所に保管してください。
- (4) 使用後はキャップを確実に閉めてください。
- (5) 他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因となったり、品質が変わることがあります。)
- (6) 使用期限(外箱、ラベルに記載)を過ぎた製品は使用しないでください。
また、使用期限内であっても、一旦開封した後は、すみやかに使用してください。
- (7) 容器内に水道水や他の液剤を混入させないでください。
(本剤の効力が変わることがあります。)
- (8) 濁りを生じている場合は使用しないでください。
- (9) 使用済みの空容器等はプラスチック製のため、各自治体の取り決めに従って廃棄してください。

■ 内容量

内容量:100mL

シラミについて

ヒトに寄生するシラミには、アタマジラミ、コロモジラミ、ケジラミの3種類があり、皮膚から吸血して、かゆみ、湿疹などを起こします。特に保育園、幼稚園や小学校で集団で発生するシラミはアタマジラミです。

種類

| 種類 | アタマジラミ | コロモジラミ | ケジラミ |
|--------|---|---|---|
| 外観形状 |  |  |  |
| 体長 | 2~4mm | 2~4mm | 1~2mm |
| 寄生部位 | 頭髮 | 衣類 | 主に陰毛 |
| 主な感染経路 | 頭髮の接触 | 体の接触、衣類 | 性行為 |

シラミの生活史



アタマジラミの被害と感染経路

＜被害＞

人の毛髪に寄生し、頭皮から吸血してかゆみや湿疹などを起こします。

寄生初期には自覚症状のない子どもも多いようですが、寄生する数が増えると、次第にかゆがるようになります。

頭皮をかきすぎて炎症を起こす場合があります。

＜感染経路＞

頭と頭が接触すること、身の回りの物(寝具・帽子・タオル・ブラシなど)を共用すること、衣類を他の人の物と重ねて置くことなどで感染が広がります。

※清潔にしている場合でも寄生されることがあります。



使用方法(頭髪に使用する場合)

①あらかじめ水又はぬるま湯で頭髪を少し濡らしてください。




②ボトルの目盛を参考に1回量として10~20mLご使用ください。



③毛の生え際に十分にいきわたるように又全体に均等になるように泡立ててください。




④頭にタオルを巻くなどして目、耳、鼻、口等に入らないようにして、5分間待ってください。



⑤水又はぬるま湯で薬液を十分に洗い流してください。そのあとは通常のシャンプーやリンスを使用してください。



⑥この操作を1日1回、3日に1度ずつ(2日おきに)、3~4回繰り返してください。



※:卵は約7日でふ化します。薬剤はシラミの卵にも浸透してある程度の効果を発揮しますが、一部ふ化するものもありますので、3~4回繰り返して使用してください。

2way専用クシの使用方法

卵や卵のぬけがらはしっかりと毛にこびりついてとれにくいので、添付の「専用クシ」でいねいに取ってあげてください。専用クシは使用後、55℃以上のお湯に5分間以上浸漬し、付着した卵を殺卵してから再使用してください。(80℃以上のお湯に浸けた場合、専用クシが変形することがありますが、性能上は問題ありません。)

専用クシの幅広部で髪全体をとかした後、幅狭部で卵や卵のぬけがらをすきとってください(シャンプー後の髪が濡れた状態でも乾いた状態でもご使用いただけます)。

