

医薬品
虫よけ



アース
サテクト
-ミスト-

RICHRICH
30

サラテクトミスト
リッチリッチ 30

虫よけ成分
最高濃度
30%
※
配合

※2018年11月時点で
発売中サラテクトでは最

蚊からお肌を守る

マダニにも効く

ウォーターin

お肌にやさしい
4種のうるおい成分配合

PPG・ヒアルロン酸Na・
ビタミンC・モモ葉エキス

第2類医薬品

200mL

サラテクトミスト リッチリッチ 30 (吸血害虫忌避剤)

●皮膚アレルギーテスト済み

(全ての方にアレルギーが起きないというわけではありません。)

【効能・効果】蚊、ブユ(ブユ)、アブ、ノミ、イエダニ、マダニ、サシバ
エ、トコジラミ(ナンキンムシ)、ツツガムシの忌避

【使用方法】レバーの下にある白いストッパーをOPENの位置に合
わせてください。使用後はストッパーを元の位置に戻してください。

1.蚊、ブユ(ブユ)、アブ、ノミ、イエダニ、マダニ、サシバエ、トコジラミ
(ナンキンムシ)の忌避に使用する場合 前から
10~15cm離して、適量を肌の露出面にまん
べんなくスプレーする。顔、首筋には、適量を手
のひらに一度スプレーしてから肌に塗布する。
2.ツツガムシの忌避に使用する場合 前から10
~15cm離して、適量を肌の露出面及び寝物やスボンの裾等にまんべん
なくスプレーする。顔、首筋には、適量を手のひらに一度スプレーしてか
ら肌に塗布する。※現れにくい場合、逆さではスプレーできません。



年齢による使用の目安

12才以上 1回の使用で概ね5~8時間持続(経過時間や発汗等
の状況に合わせて適量、再度使用する)
12才未満 使用しないこと(本品はディート濃度が高いため、
ディート濃度12%以下の製品を使用すること)

【使用上の注意】**してはいけないこと** ●目や口の周肌、粘膜、傷口な
どお肌の弱い部分にはスプレーしないこと。誤ってかかった場合は直ちに
水でよく洗うこと。●用法・用量に**関連する注意** ●定められた用法・用
量を厳守すること。●適量とした使用を避け、蚊、ブユ(ブユ)等が多い
戸外での使用等、必要な場合にのみ使用すること。●ツツガムシの忌
避を目的として使用する場合には、さらに以下のことに注意すること。
薬剤だけに頼らず、シャツ、ズボン、長靴等を使用し、肌を露出しないよう
にすること。ツツガムシは見えにくいので、生息しているような場所に立ち
入る前にスプレーすること。●**その他の注意** ●カーペットにカサレなどの異
常が生じた場合は、直ちに使用を中止すること。●目に入ったり、飲ん
だり、なめたり、吸い込んだりすることがないようにし、塗布した手で目
をこすらないこと。万一目に入った場合には、すぐに大量の水又はぬる
ま湯でよく洗い流すこと。また、具合が悪くなる等の症状が現れた場
合には、直ちに、本品にエタノールとディートが含まれていることを医
師に告げて診療を受けること。●**刺激に注意するため、初めて使用す
る場合は上腕の内側などに試して、異常のないことを確かめること。**

●**腕時計等のプラスチック製品は変色
のおそれがあるのでかけないこと。** ●シャツ、ズボン等の衣服に
スプレーする場合、繊維の種類によっては本剤
により変質する場合があります。合成繊維は変質し
やすいので注意すること。●**ストッキングなど
の上に直接スプレーしないこと(生地が傷む場
合があります)。** ●**マニキュア、ジェルネイル
等、装飾したネイルに直接かけないこと。** ●直
射日光や火気避け、子供の手の届かない涼し
い所に保管すること。●**使用期限(ボトル底面
に記載)を過ぎた製品は使用しないこと。**

【有効成分】1本(200mL)中ディート60g 添加
物として、ポリプロピレングリコール(PPG)、モモ
葉エキス、ヒアルロン酸Na(2)、アスコルビン酸
(ビタミンC)、クエン酸、クエン酸Na、香料、エタ
ノール、精製氷を含有します。

【副作用被害救済制度】
TEL 0120-149-931 第2類医薬品

Made in Japan
アース製薬株式会社 BUY 第二石油類
〒101-0048 危険等級Ⅲ
東京都千代田区神田司町2-12-1
【お客様窓口】0120-81-6456 エタノール ボトル
受付時間9:00~17:00 200mL ボンブ
(土、日、祝日を除く) ラベル
<https://www.earth.jp> 火気厳禁 フィルム

