

**【販売名】**近江兄弟社メンターム虫よけスプレー-EX  
【有効成分】(原液100mL中)アート12.0g 添加物として、ポリソルベート60、オリブ油、ユーカリ油、二酸化ケイ素、エタノールを含有する。噴射剤:LPG

【効能】蚊、ブユ(フヨ)、サシバエ、アブ、トコジラミ(アンキムシ)、ノミ、イエダニ、ツツガムシの忌避

【使用方法】●**使用前にはよく振って**、お肌から約10cm離して噴霧してください。●同じ箇所に続けて3秒以上噴霧しないでください。

【用法・用量】(蚊、ブユ(フヨ)、サシバエ、アブ)トコジラミ(アンキムシ)、ノミ、イエダニの忌避)適量を用時、腕、足等の皮ふの露出部分に噴霧する。顔・首筋には過量を一度手のひらに噴霧してから塗布する。(ツツガムシの忌避)適量を4~6時間毎に皮ふの露出部分及び履物やズボンの脛等にムラなく噴霧する。顔・首筋には過量を一度手のひらに噴霧してから塗布する。

【用法・用量に関する注意】●漫然とした使用を避け、蚊、ブユ(フヨ)等が多い戸外での使用等、必要な場合にのみ使用してください。●6か月未満の乳児には使用しないでください。●小児(12歳未満)の場合、保護者等の指導監督の下で、6か月~2歳未満は1日1回、2歳~12歳未満は1日1~3回を目安にお使いください。

なお、顔には使わないでください。●目に入ったり、飲んだり、なめたり、吸い込んだりすることがないようにし、塗布した手で目をこすらないでください。万一目に入ったら、すぐに大量の水又はぬるま湯でよく洗い流してください。また、具合が悪くなる等の症状が現れた場合は、直ちに本剤にエタノールとアートが含まれていることを医師に告げて診療を受けてください。

●本剤は外用にのみ使用し、内服しないでください。

●ツツガムシに対する忌避効果は認められていますが、薬剤だけに頼らず、シャツやズボン、長靴等を使用し、肌を露出しないようにしてください。●シャツやズボンなどの衣服に噴霧する場合、綿維の繊維によっては本剤により変質する場合があります。合成繊維は変質しやすいので注意してください。●ストッキング等の上から噴霧しないでください(生地を傷める場合があります)。

**【使用上の注意】**【してはいけないこと】(守らないと副作用がおこりやすくなります)次の部位には使用しないでください。  
創傷面、目の周囲、粘膜等  
**【相談すること】**1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。(1) 医師の治療を受けている人。(2) 薬などによりアレルギー症状(例えば発疹・発赤・かゆみ・かぶれ等)を起こしたことがある人。(3) 温疹やただれのある人。2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。  
皮膚: 発疹・発赤・かゆみ・はれ等

内容量 200mL 第一石油類80mL 火気厳禁  
■作用用法 TEL 0120-149-931 第2類医薬品

**【保管及び取扱い上の注意】**●車の中や直射日光のあたる場所、暖房器具(ファンヒーター等)の周囲は温度が上がり破裂する危険がありますので置かないでください。●缶の詰みを防ぐため、水回りや温氣の多い場所には置かないでください。●食物、食器、玩具にかかるないように注意してください。●時計・めがね等のプラスチック類、ビニール類、塗装のしてある床・家具等に付着しないように注意してください(変質する場合があります)。●タバコ等の火気には十分注意してください。●小児の手の届かない所に保管してください。

●使用期限は缶底面に記載。

**【ガス抜きキャップ付き(ガス抜きの注意事項と方法)**

中身を完全に使い切ってから、火気や人気のない戸外で行ってください。本品のキャップ以外使用しないでください。

**【ガス抜き方法】**①キャップを取り外します。②キャップの下に新聞紙などを敷き、平らで安全なところにおきます。③図のように缶を垂直に押し込んでください。ガスが過剰噴射されます。④噴射音が完全に消えてから、市町村等で定められた方法によって廃棄してください。大量に使い残した場合の廃棄方法については、メーカーにお問い合わせください。



お問合せ先:株式会社近江兄弟社  
お客様相談室 TEL:0748-32-3135  
受付時間:午前 8:30から 午後 5:30まで  
(土・日・祝日を除く)  
製造販売元:  
株式会社 近江兄弟社  
滋賀県近江八幡市魚屋町元29

## 火気と高温に注意

高圧ガスを使用した可燃性の製品であり、危険なため、下記の注意を守ること。

- ①炎や火気の近くで使用しないこと。
- ②火気を使用している室内で大量に使用しないこと。
- ③高温にすると破裂の危険があるため、直射日光の当たる所や火気等の近くなど温度が40度以上となる所に置かないこと。
- ④火の中に入れないこと。
- ⑤使い切って捨てること。

高圧ガス: LPG

【保管及び取扱い上の注意】●車の中や直射日光のある場所、暖房器具（ファンヒーター等）の周囲は温度が上がり破裂する危険がありますので置かないでください。●缶の詰めを防ぐため、水回りや温湯の多い場所には置かないでください。●食事、食器、玩具にかかるないように注意してください。●時計・めがね等のプラスチック類、ビニール類、塗装のある床・家具等に付着しないように注意してください（変質する場合があります）。●タバコ等の火気には十分注意してください。●小児の手の届かない所に保管してください。●使用期限は缶底面に記載。

#### ガス抜きキャップ付き（ガス抜きの注意事項と方法）

中身を完全に使い切ってから、火気や人気のない戸外で行ってください。本品のキャップ以外使用しないでください。

【ガス抜き方法】①キャップを取り外します。②キャップの下に新聞紙などを敷き、平らで安全なところにおきます。③図のように缶を垂直に押し込んでください。ガスが連続噴射されます。

④噴射音が完全に消えてから、市町村等で定められた方法によって廃棄してください。

大量に廃した場合の廃棄方法については、メーカーにお問い合わせください。

お問合せ先：株式会社近江兄弟社

お客様相談室 TEL:0748-32-3135  
受付時間：午前 8:30から午後 5:30  
まで（土・日・祝日を除く）

製造販売元

株式会社 近江兄弟社  
滋賀県近江八幡市魚屋町元29



## 火気と高温に注意

高圧ガスを使用した可燃性の製品であり、危険なため、下記の注意を守ること。  
 ①炎や火気の近くで使用しないこと。  
 ②火気を使用している室内で大量に使用しないこと。  
 ③高温にすると破裂の危険があるため、直射日光の当たる所や火気等の近くなど温度が40度以上となる所に置かないこと。  
 ④火の中に入れないこと。  
 ⑤使い切って捨てること。  
 高圧ガス：LPG

# 医薬品



虫よけ成分 蚊やイエダニをよせつけない!  
**12%配合 効きめ長持ち**

(うるおい成分)  
**オリーブオイル配合**

近江兄弟社<sup>®</sup>  
**メンターム 虫よけスプレーEX**

第2類医薬品

200mL

OMI■

【販売元】近江兄弟社メンターム虫よけスプレーEX  
 【有効成分】(原液100mL中)デイート12.0g、添加物として、ポリソルベート60、オリーブ油、ユーカリ油、二酸化ケイ素、エタノールを含有する。噴射剤:LPG  
 【効能】蚊、ブク(ヨモギ)、サシバエ、アブ、トコジラミ(ナンキンシム)、ノミ、イエダニ、マダニ、ツツガムシの忌避  
 【使用方法】●使用前にはよく振って、お肌から約10cm離して噴霧してください。●同じ箇所に続けて3秒以上噴霧しないでください。

【用法用量】(蚊、ブク(ヨモギ)、サシバエ、アブ、トコジラミ(ナンキンシム)、ノミ、イエダニ、マダニの忌避)適量を用時、腕、足等の皮膚の露出部分に噴霧する。顔、首筋には適量を一度手のひらに噴霧してから塗布する。(ツツガムシの忌避)適量を4~6時間毎に皮膚の露出部分及び寵物やズボンの裾等にムラなく噴霧する。顔、首筋には適量を一度手のひらに噴霧してから塗布する。

【用法・用量に関する注意】●漫然とした使用を避け、蚊、ブク(ヨモギ)等が多い戸外での使用等、必要な場合のみ使用してください。●6か月未満の乳児には使用しないでください。●小児(12歳未満)の場合は、保護者等の指導監督の下で、6か月~2歳未満は1日1回、2歳~12歳未満は1日1~3回を目安にお使いください。なお、顔には使わないでください。●目に入ったり、飲んだり、めたり、吸い込んだりすることがないようにして、塗布した手で目をこすらないでください。万一目に入ったら、すぐに大量の水又はぬるま湯でよく洗い流してください。また、具合が悪くなる等の症状が現れた場合は、直ちに本剤にエタノールとディートが含まれていることを医師に告げて診療を受けてください。●本剤は外用にのみ使用し、内服しないでください。●ツツガムシに対する忌避効果は認められていますが、薬剤だけ頼らず、シャツやズボン、長靴等を使用し、肌を露出しないようにしてください。●シャツやズボンなどの衣服に噴霧する場合、繊維の種類によっては本剤により変質する場合があります。合成繊維は変質しやすいので注意してください。●ストッキング等の上から噴霧しないでください(生地を傷める場合があります)。

【使用上の注意】してはいけないこと(守らないと副作用がおこります)次の部位には使用しないでください。創傷面、目の周囲、粘膜等

【相談すること】1.次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。(1)医師の治療を受けている人。(2)薬などによりアレルギー症状(例えば発疹・発赤・かゆみ・かぶれ等)を起こしたことがある人。(3)湿疹やただれのある人2.使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。  
 皮膚:発疹・発赤・かゆみ・はれ等

内容量 200mL 第一石油類80mL 火気厳禁  
 副作用救済制度 TEL:0120-149-931 第2類医薬品

