



フマキラー

防疫用殺虫剤

フマキラー
スミチオン[®]
粉剤

第2類医薬品

フェニトロチオン1.5%

10kg

使用期限

製造番号

使用上の注意等(裏面)をよく読んでお使いください。

[製造販売元]



フマキラー株式会社

〒739-0494 広島県廿日市市梅原1-11-13

[本社所在地]

〒101-8606 東京都千代田区神田美倉町11

お客様相談室 ☎0077-788-555 ☎03-3255-6400

スミチオン[®]粉剤

第2類医薬品

【販売名】 フマキラー スミチオン粉剤
【有効成分】 フェニトロチオン……………1.5%
【その他の成分】 クレー、イソプロピルアシッドフォスフェート
【効能・効果】 ハエ成虫、ハエ幼虫(ウジ)、蚊成虫、蚊幼虫(ボウフラ)、ゴキブリ(油虫)、ノミ、トコジラミ(ナンキンムシ)、イエダニ及びマダニの防除。

【用法・用量】
一般に害虫の生息または発生場所に対して使用してください。
●ハエ・蚊成虫：1㎡につき10gを主として戸外の生息場所にそのまま散布してください。
●ハエ幼虫(ウジ)：1㎡につき35gを幼虫の発生場所、特に便池に対してそのまま散布してください。
●蚊幼虫(ボウフラ)：1㎡につき7g(水深5~10cmとして有効成分1~2ppm)を幼虫の発生場所、特に停滞水域に対して均一に散布してください。水深が10cmを超える場合は有効成分濃度を基準としてください。
●ゴキブリ(油虫)：1㎡につき20gの割合で重点的に、ゴキブリのすみ場所やその周辺部にそのまま散布してください。
●ノミ、トコジラミ(ナンキンムシ)、イエダニ、マダニ：1㎡につき20gの割合で使用してください。

【使用上の注意】
注意 一人体に使用しないこと
してはいけません

- 薬剤を口や目に入れないこと。
- 小分けするときは、食品用の容器等、誤用のおそれのあるものを利用しないこと。

【相殺すること】

- 万一、身体に異常を来した場合は、誤って薬剤を飲み込んだ場合は、直ちに本剤の有効成分系(フェニトロチオン)の殺虫剤であることを医師に告げて診療を受けること。

【保管および取り扱い上の注意】

(1) 使用に際しての注意

- 定められた用法・用量を厳守すること。
- 環境を汚染しないよう乱用を避けること。特に水域に使用する場合は、魚や水棲生物に対するできるかぎりの配慮をして使用すること。
- 食品、食器、おもちゃ、愛玩動物、飼料、寝具、衣類等はあらかじめ他へ移すかあるいは格納し、薬剤がつかないようにすること。

(2) 使用中や使用後の注意

- なるべく身体の露出部分を少なくして薬剤を浴びないようにするとともにできるだけ吸い込まないように注意すること。
- 使用した後、あるいは皮膚に付いたときは、石けん水で良く洗い、水でうがいをする。なお、眼に入った場合は、直ちに水でよく洗い流すこと。
- 散布に用いた器材はよく手入れをしておくこと。

(3) 保管上の注意

- 食品・食器、飼料等と区別し、小児の手の届かない乾燥した冷暗所に保管すること。
- 使用后、残った薬剤は必ず保管場所にもどり、容器は封をしておくこと。

【その他の注意】

- 使用済みの空容器等は、適切に処分すること。(袋は燃えるごみとして捨てること)
- スミチオンは住友化学株式会社の登録商標です。

スチアエ

スミチオン[®]粉剤

フマキラー

防疫用殺虫剤

フマキラー®
スミチオン®
粉剤

フェニトロチオン1.5%

500g

第2類医薬品

使用上の注意等（裏面）をよく読んでお使いください。

【製造販売元】



フマキラー株式会社

〒739-0494 広島県廿日市市梅原1-11-13

【本社所在地】

〒101-8606 東京都千代田区神田美倉町11

お客様相談室 ☎ 0077-788-555 ☎ 03-3255-6400

【販売名】フマキラーズミチオン粉剤

【有効成分】フェニトロチオン……………1.5%

【その他の成分】クレー、イソプロピルアシッドフォスフェート

【効能・効果】ハエ成虫、ハエ幼虫(ウジ)、蚊成虫、蚊幼虫(ボウフラ)、ゴキブリ(油虫)、ノミ、トコジラミ(ナンキンムシ)、イエダニ及びマダニの防除。

第2類医薬品

【用法・用量】

一般に害虫の生息または発生場所に対して使用してください。

- ハエ・蚊成虫：1㎡につき10gを主として戸外の生息場所そのまま散布してください。
- ハエ幼虫(ウジ)：1㎡につき35gを幼虫の発生場所、特に便池に対してそのまま散布してください。
- 蚊幼虫(ボウフラ)：1㎡につき7g(水深5～10cmとして有効成分1～2ppm)を幼虫の発生場所、特に停滞水域に対して均一に散布してください。水深が10cmを超える場合の用量は有効成分濃度を基準としてください。
- ゴキブリ(油虫)：1㎡につき20gの割合で重点的に、ゴキブリの潜み場所やその周辺部にそのまま散布してください。
- ノミ、トコジラミ(ナンキンムシ)、イエダニ、マダニ：1㎡につき20gの割合で使用してください。

【使用上の注意】

注意—人体に使用しないこと

してはいけないこと

- 薬剤を口や目に入れないこと。
- 小分けするときは、食品用の容器等、誤用のおそれのあるものを利用しないこと。

相談すること

- 万一、身体に異常を来した場合や、誤って薬剤を飲み込んだ場合は、直ちに本剤が有機リン系の殺虫剤である事を医師に告げて診療を受けること。

保管および取り扱い上の注意

(1) 使用に際しての注意

- 定められた用法・用量を厳守すること。
- 環境を汚染しないよう乱用を避けること。特に水域に使用する場合は、魚や水棲生物に対するできるかぎりの配慮をして使用すること。
- 食品、食器、おもちゃ、愛玩動物、飼料、寝具、衣類等はあらかじめ他へ移すかあるいは格納し、薬剤がかからないようにすること。

(2) 使用中や使用後の注意

- なるべく身体の露出部分を少なくして薬剤を浴びないようにするとともにできるだけ吸い込まないように注意すること。
- 使用した後、あるいは皮膚に付いたときは、石けん水で良く洗い、水でうがいをすること。なお、眼に入った場合は、直ちに水でよく洗い流すこと。
- 散布に用いた器材はよく手入れをしておくこと。

(3) 保管上の注意

- 食品・食器、飼料等と区別し、小児の手の届かない乾燥した冷暗所に保管すること。
- 使用后、残った薬剤は必ず保管場所にもどし、容器は封をしておくこと。

その他の注意

- 使用済みの空容器等は、適切に処分すること。

スミチオンは住友化学株式会社の登録商標です。

スファエ



使用期限

製造番号

