

第3類医薬品


ゼリア新薬

関節痛・腰痛・神経痛・疲労回復

コンドロイチン ZS錠[®]

特徴

痛みは生体への注意信号でもあり、重要な生理現象ですが、放置しておく和不快な症状が続き、日常生活などに支障をきたしてしまいます。特に関節の痛み、腰の痛みなどは加齢とともに起こりやすく、健康的な生活を送る上でこのような症状の改善は大切な事です。

コンドロイチン硫酸は身体中にある物質で、特に関節軟骨や血管、角膜などに多く存在しており、身体の弾力性保持や物理的なクッションの役割、また保水性などの働きをもっています。さらに、細胞の新陳代謝(栄養を取り入れたり、老廃物を排泄したりすること)に関与しています。

こんな方に

- 階段の昇り降りが苦痛
- 立ったり座ったりが辛い
- 冷えると痛む
- 疲れてくると腰が重くなる
- 重いものを持ち上げて腰を痛めたことがある
- 季節の変わり目に関節痛や神経痛を起こす
- 肩が上がらない・引っかかる感じがする
- 最近耳が聞こえにくくなった
- 騒音の多い環境にいる
- 疲れがなかなか取れない



使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤, かゆみ
消 化 器	下痢, 吐き気, 胃部不快感

3. 1 ヶ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

(必ず裏面もお読みください)

効能・効果

関節痛，神経痛，腰痛，五十肩，神経性難聴，音響外傷性難聴，疲労回復

用法・用量

1回2錠，1日3回服用してください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)定められた用法・用量を守ってください。
- (2)小児には服用させないでください。
- (3)服用時に錠剤をそのまま口中に入れると，口中に付着することがあります。多めの水又はぬるま湯と一緒に服用してください。
- (4)食前・食後，いずれの服用でもかまいません。

* 成分

1日量（6錠）中

成分	分量
コンドロイチン硫酸エステルナトリウム	1,560mg

添加物：ケイ酸カルシウム，軽質無水ケイ酸，結晶セルロース，アセスルファムカリウム，ステアリン酸マグネシウム，香料

〈成分・分量に関連する注意〉

- 香料を配合していますので開封時等においてにおいを感じる場合があります。

* 保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れかえないでください。（誤用の原因になったり品質が変わることがあります。）
- (4)本剤は湿気を吸いやすいので，服用のつど瓶のフタを十分にしめてください。しめ方が不十分ですと湿気などのため変質することがあります。また，本剤をぬれた手で扱わないでください。誤って錠剤をぬらした場合は，ぬれた錠剤は瓶に戻さず，廃棄してください。
- (5)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

本品についてのお問い合わせは，お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。
ゼリア新薬工業株式会社 お客様相談室 電話 03-3661-2080
〒103-8351 東京都中央区日本橋小舟町10-11
受付時間 9:00～17:50（土・日・祝日を除く）

ホームページ <http://www.zeria.co.jp>

副作用被害救済制度のお問い合わせ先

(独)医薬品医療機器総合機構 http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html
電話 0120-149-931（フリーダイヤル）

ゼリア ZS[®] はゼリア新薬工業株式会社の登録商標です。



製造販売元
ゼリア新薬工業株式会社
東京都中央区日本橋小舟町10-11

D15
コンドロイチンZS錠