

\*2022年2月改訂

服用に際し、この説明書を必ず読むこと。また、必要などき読める様に大切に保管すること。

# 細胞賦活用薬 錠剤 **ルミンA-50γ**

第3類医薬品

## 特徴

本品の有効成分クリプトシアニンO.A.コンプレックスは、組織細胞を賦活し、その生長を促進させ、細網内皮系の機能を高め、細動脈の血行を旺盛にします。この作用で体に出来た炎症や症状は元の状態になるように修復されますので、アレルギー性疾患、食欲不振、倦怠、貧血、一般虚弱体質、凍傷、熱傷、一般創傷、急性化膿性疾患、末梢神経性疾患に効果があります。



アレルギー性疾患



食欲不振、倦怠  
貧血



一般虚弱体質



凍傷、熱傷  
一般創傷



急性化膿性疾患



末梢神経性疾患

## 使用上の注意



相談すること

- 次の方は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談下さい。
  - 妊婦又は妊娠していると思われる方。
  - 医師の治療を受けている方。
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談下さい。

関係部位	症 状
皮 膚	創傷の分泌増加
消 化 器	食欲不振
そ の 他	発熱

- 1ヶ月くらい服用しても症状の改善が見られない場合は、服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談下さい。

裏面に続く

## 効能・効果

アレルギー性疾患、食欲不振、倦怠、貧血、一般虚弱体質、凍傷、熱傷、一般創傷、急性化膿性疾患、末梢神経性疾患

## 用法・用量

1日1回1錠を空腹時に白湯又は冷水で服用して下さい。効果があらわれない場合には、1回2錠を服用して下さい。

〈用法・用量に関連する注意〉

服用に際して、次のことにご注意下さい。

- 幼児または小児に服用させる場合は、薬剤がのどにつまらないよう、保護者の指導監督の下に服用させて下さい。
- 3歳未満の乳幼児には、のどにつまる恐れがありますので服用させないで下さい。

## 成分・分量

本品1錠中

クリプトシアニンO.A.コンプレックス50μgを含有しています。

添加物としてアラビアゴム、タルク、炭酸水素ナトリウムを含有しています。

## 保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。
- 小児の手のとどかない所に保管して下さい。
- 他の容器に入れかえないで下さい（誤用の原因になったり品質が変わる）。
- 使用期限を過ぎた製品は服用しないで下さい。なお、開封後はできるだけ早く服用して下さい（品質保持のため）。

## その他の注意

- 本剤は、錠剤の表面が多少まだらに見えることがありますが、効果に変わりはありません。
- 容器内に乾燥剤が入っています。服用しないで下さい。

問い合わせ先

- 購入したお店
- 株式会社林原 なんでも相談室  
電話：086-296-7066  
FAX：086-296-7202  
受付時間 電話：午前9時～午後5時  
(土、日、祝日を除く)  
FAX：常時可

発売元 **日邦薬品工業株式会社**  
東京都渋谷区代々木3-46-16

製造販売元  
株式会社林原  
\*住所：〒702-8006 岡山市中区藤崎675-1

副作用被害救済制度の問い合わせ先  
(独)医薬品医療機器総合機構

[https://www.pmda.go.jp/kenkouhigai\\_camp/index.html](https://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html)

電話：0120-149-931