

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。



# 禁煙補助薬 ニコチネル パッチ20 パッチ10

第1類医薬品

## 特徴

- ニコチネル パッチ20・ニコチネル パッチ10は、タバコをやめたい人のための医薬品です。
- 禁煙時のイライラ・集中困難などの症状を緩和し、禁煙を成功に導くことを目的とした禁煙補助薬です。(タバコを嫌いにさせる作用はありません。)
- 1日1回貼るだけの簡単な使用方法で、あなたの禁煙をサポートします。
- シンプルな2ステップの禁煙プログラムにより、約2カ月で、あなたを無理のない禁煙へと導きます。
- 独自の経皮吸収治療システム(※)により、禁煙に必要なレベルのニコチンを安定して皮膚へ放出します。(※TTT)



## 使用上の注意



### してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)

1. 次の人は使用しないでください。
  - (1) 非喫煙者(タバコを吸ったことのない人及び現在タバコを吸っていない人)  
(はきけ、腹痛、めまいなどの症状があらわれることがあります。)
  - (2) 他のニコチンを含有する製剤を使用している人
  - (3) 妊婦又は妊娠していると思われる人
  - (4) 授乳中の人が(乳汁中への移行が認められています。)
  - (5) 重い心臓病を有する人  
①3ヶ月以内に心筋梗塞の発作を起こした人 ②重い狭心症と医師に診断された人  
③重い不整脈と医師に診断された人
  - (6) 急性期脳血管障害(脳梗塞、脳出血等)と医師に診断された人
  - (7) うつ病と診断されたことのある人(禁煙時の離脱症状により、うつ症状を悪化させることができます。)
2. 本剤の成分によりアレルギー症状(例えは、発疹・発赤・かゆみ・はれ等)を起こしたことがある人
3. 本剤を一度に2枚以上使用しないでください。
4. 本剤を使用中及び使用直後は、次のことはしないでください。(はきけ、腹痛、めまいなどの症状があらわれることがあります。)
  - (1) ニコチニガム製剤の使用 (2) 喫煙
5. 本剤を使用中は、サウナの使用や激しい運動はしないでください。(はきけ、腹痛、めまいなどの症状があらわれることがあります。)



### 相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください。
  - (1) 医師の治療を受けている人
  - (2) 他の薬を使用している人(他の薬の作用に影響を与えることがあります。)
  - (3) 薬などによりアレルギー症状(例えは、発疹・発赤・かゆみ・はれ等)を起こしたことがある人
  - (4) 高齢者及び20才未満の人
  - (5) 次の診断を受けた人: 心臓病(心筋梗塞、狭心症、不整脈、心不全等)、胃・十二指腸潰瘍、高血圧、肝臓病、腎臓病、糖尿病(インスリン製剤を使用している人)、甲状腺機能亢進症、褐色細胞腫又はパラシングリオーマ、脳血管障害(脳梗塞、脳出血等)、末梢血管障害(パージャー病等)、全身性皮膚疾患(アビテ皮炎、湿疹性皮炎)、てんかん、神経筋接合部疾患(重症筋無力症、イートン・ランバート症候群)
  - (6) 発熱のある人(ニコチンの吸収量が増加し、過量摂取による可能性があります。)

2. 次の場合は、直ちに本剤をはがし、石鹼などを使用せずに、皮膚表面を水で洗い乾燥させてください。

それでも症状が続く場合は、この説明文書を持って医師又は薬剤師に相談してください。

- (1) 使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤・かぶれ・かゆみ・じんましん・水疱・はれ・色素沈着・痛み・ヒリヒリ感・熱感・皮膚のはがれ・フケの増加
精神神経系	不眠・頭痛・めまい・しづれ・悪夢・疲労感・眠気・集中困難・情緒不安定・手足のふるえ・神経過敏・感覚障害・不安・気分の落ち込み
消化器	恶心・嘔吐・腹痛・胸やけ・食欲不振・消化不良・便秘・下痢・口内炎
肝臓	全身のだるさ・皮膚や白目が黄色くなる
循環器	動悸・血圧の上昇・胸苦しさ
自律神経系	口のかわき・ほてり・多汗・だ液の増加・顔が青白くなる
呼吸器系	せき・息苦しさ・のどの違和感
筋・骨格系	筋肉痛・肩こり・背中の痛み・関節痛
その他	口中の苦味・味覚異常・耳鳴り・疼痛・ニコチン臭・不快感・胸の痛み・寒気・むくみ・脱力・目のかすみ・貼付した腕が重く感じる

(2) まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック(アナフィラキシー)	使用後すぐにじんましん・浮腫・胸苦しさとともに、顔色が青白くなり、手足が冷たくなり、冷や汗・息苦しさ等があらわれる。

3. 次の人は過量摂取になる可能性があります。下記の症状があらわれた場合は、直ちに本剤をはがし、石鹼などを使用せずに、皮膚表面を水で洗い乾燥させてください。

それでも症状が続く場合は、この説明文書を持って医師又は薬剤師に相談してください。

- (1) 使用後、次の症状があらわれた場合

症状の名称	症 状
ショック(アナフィラキシー)	使用後すぐにじんましん・浮腫・胸苦しさとともに、顔色が青白くなり、手足が冷たくなり、冷や汗・息苦しさ等があらわれる。

4. 週間使用しても、タバコの本数が全く減らない場合や、禁煙当初のイライラ、不安、集中困難などの症状が軽くならず、禁煙が続けれられない場合は、使用を中止し、この説明文書を持って医師又は薬剤師に相談してください。

## 効能・効果

禁煙時のイライラ・集中困難・落ち着かないなどの症状の緩和

## 用法・用量

最初の6週間はニコチネル パッチ20を1日1回、1枚を起床時から就寝時まで貼付し、次の2週間はニコチネル パッチ10を1日1枚を起床時から就寝時まで貼付してください。禁煙によるイライラなどの症状がなくなり、禁煙を続ける意志が強く、禁煙を続けられる自信がある場合には、6週間のニコチネル パッチ20を使用後、7週目以降のニコチネル パッチ10を使用せずに、本剤の使用を中止してもかまいません。貼付する場所は上腕部、腹部あるいは腰背部に毎日場所を変えて貼付してください。

### 使用スケジュール

#### トータル8週間

禁煙開始

パッチ20 6週間使用

パッチ10 2週間使用

終了

### 【用法・用量に関する注意】





1. 定められた用法・用量を厳守してください。
2. 本剤を一度に2枚以上使用しないでください。
3. 本剤を切り分けて使用しないでください。
4. 連続して2週間を超えて使用しないでください。

5. 次の検査及び治療を受けるときは、本剤をはがしてください。(貼付部位にやけどを生じるおそれがあります。)

- (1) MRI (2) ジアテルミー(高周波療法) (3) 電気的除細動(AED等)

### ニコチネル パッチの使い方

- ①袋をハサミで切り、②薬剤を取りやすくする、③シートから薬剤をはがす、④体に貼り、押さえる



この袋は、小児が容易に取り出せない特殊な包装になっていますので、裏面の点線に沿って、貼付剤を傷つけないようにハサミで切り、薬剤を取り出してください。

アルミシートの小さいほうを注意して手で切り取ります。

アルミシートをゆっくりとはがします。

丸いほうが薬剤です。

肌にシワができるないように伸ばして貼ります。

薬のノズルが浮かないように10秒くらい手のひら、指先でしっかりと押さえます。

### 貼るときの注意



左右の上腕部、腹部、腰背部のいずれかに貼付してください。

①皮膚への刺激を避けるため、毎日場所を変えて貼付してください。

② 繰り返し同じところには貼付しないでください。

③ 傷や皮膚病のある場所、またはベルトラインや体毛の濃い部分は避けて貼付してください。

④ 貼付する場所がぬれているときは、タオルなどでよく拭いて乾燥させてから貼付してください。

## 成 分

品 名	有効成分	添加物
ニコチネル パッチ20(20cm <sup>2</sup> )	ニコチン 35mg	アミノアルキルメタクリレートコポリマーE、中鎖脂肪酸トリグリセリド、その他1成分
ニコチネル パッチ10(10cm <sup>2</sup> )	ニコチン 17.5mg	

## 保管及び取り扱い上の注意

1. 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。



2. 小児の手の届かない所に保管してください。

3. 他の人に譲り渡さないでください。

4. 使用期限过了のものは使用しないでください。

5. 使用するまでは袋を開けずに保管してください。誤って袋を開封した場合は、袋の口をテープなどでしっかりと閉め、小児の手の届かない所に保管してください。また、使用期限内であっても開封後は、1ヵ月以内に使用してください。(開封してしまったものは、品質の低下が速くなります。)

6. 使用後廃棄する場合は、粘着面を内側にして、2つに折り、小児の手の届かない所に捨ててください。

7. 本剤は、使用前とともに小児にとっては相当量のニコチンを含有していますので、重度の中毒症状を生じ、死亡にいたるおそれもあります。未使用及び使用済みの薬剤はいずれも、絶対に小児の手に入ることのないように、取り扱い及び廃棄には注意してください。

8. 万一、小児が薬剤を飲み込んだ場合は、無理に吐かせようと/or むるま湯や牛乳などを飲ませようとせず、直ちに医師の診療を受けてください。(ニコチンを溶解し吸収させやすくなり、腸からの吸収を促進することができます。)

9. 小児が薬剤を口に入れた場合はすぐに取り出してください。(袋の上からであれば、体内にニコチンが摂取される危険は低いですが、必要に応じて医師の診療を受けてください。)

### 【お問い合わせ先】

- (1) 購入した薬局・薬店

(2) グラクソ・スミスクライン・コンシューマー・ヘルスケア・ジャパン株式会社

お客様相談室

【電話】0120-099-301

【受付時間】9:00～17:00(土、日、祝日を除く)

ニコチネル製品に関する情報はこちる <https://www.nicotinell.jp>

©2019 GSKグループ

### 製造販売元

グラクソ・スミスクライン・コンシューマー・ヘルスケア・ジャパン株式会社

〒107-0052 東京都港区赤坂1-8-1

あなたの禁煙プログラムの成功に役立つ「禁煙ガイド」はこちる▼

## 1 禁煙の準備

### タバコ依存を知ろう

禁煙がむずかしいのは、タバコに含まれるニコチンへの薬物依存である【身体的依存】と喫煙習慣による【心理的依存】の2つの依存を同時に克服していく必要があります。

この2つの依存を併せてタバコ依存と呼びます。

### 身体的依存

### 心理的依存

禁煙補助薬で離脱症状を緩和しながら克服

周囲の励ましや生活習慣の改善で克服

禁煙補助薬で離脱症状を緩和しながら克服

周囲の励ましや生活習慣の改善で克服

禁煙補助薬で離脱症状を緩和しながら克服

周囲の励ましや生活習慣の改善で克服

禁煙補助薬で離脱症状を緩和しながら克服

周囲の励ましや生活習慣の改善で克服

禁煙補助薬で離脱症状を緩和しながら克服</p

**Q. 入浴時などに一度はがしたニコチネル パッチを、再度貼ることはありますか？**

**A.**一度使用したもの、はがしたものをお、再度貼ることはおすすめしません。新しい薬剤を貼るようお願いしております。

**A. 本剤を貼ったまま、または、はがした直後にはニコチンガム製剤を使用しないでください  
ニコチンを過量に摂取してしまうおそれがあり、副作用があらわれやすくなります。**

**Q. ニコチネル パッチを貼りながら喫煙しても大丈夫ですか？**

- A.** 本剤を貼ったまま、または、はがした直後には喫煙しないでください。ニコチンを過量に摂取してしまうおそれがあり、副作用があらわれやすくなります。

**Q. 半分に切って使用しても良いですか？**

**A.** 本剤は、切り分けて使用しないでください。本剤は、ニコチンが含まれている薬物貯蔵層の周りを特殊な層でくるみ、ニコチンが少しづつ体内に浸透していくよう工夫されています。切ってしまうとその構造が壊れ、ニコチンを一定量ずつ体内へ浸透させることができなくなります。

**Q. 一度に2枚以上貼っても良いですか？**

**A.** 本剤は1日1回、1枚を貼ることが正しい使い方です。一度に2枚以上貼ると、ニコチンの過量摂取になるおそれがありますので、説明文書の使用上の注意をよく読み、用法・用量を守って正しくお使いください。

詳しくはHPをご覧ください。<https://www.nicotinell.jp>

## 4 禁煙時の生活に関するアドバイス

### ●禁煙時の離脱症状とその克服方法

禁煙すると人によって程度の差はありますが、さまざまな離脱症状(いわゆる禁断症状)がでてきます。これらの症状の多くは、ニコチンに依存していた身体の中から、ニコチンが抜けたためにみられるものです。


症状	対処法
タバコが吸いたい	水を飲む、深呼吸、低カロリーのガムや干昆布をかむ、軽い運動
頭痛	GUM
足を高くしてあおむけに寝る	

深呼吸やストレッチなど自分にあった方法

A simple line drawing of a hand in profile, facing right. The fingers are slightly curled, and the thumb and forefinger are pinching a small, round object. This object has a small stem or root extending from its bottom, suggesting it might be a seedling or a small plant.


**心理的依存の克服**  
いったん禁煙に成功しても、ちょっとしたき  
な状況には、特に注意が必要です。重びタ

The illustration consists of two panels. The left panel, titled 'アルコールの席' (Alcohol consumption), shows two men in business suits at a table; one is holding a glass of beer and the other is holding a cigarette. The right panel, titled '仕事上のストレス' (Work stress), shows a woman sitting at a desk overwhelmed by a large stack of papers, with sweat drops on her forehead.





## 自信をもつ

- 究極の秘訣：ネバーギブアップもし、あなたが禁煙中にタバコを吸ってしまっても、禁煙をあきらめることはできません。2～3度の失敗は通常みられることで、失敗自体を問題にしてくじけたり、自己嫌悪に陥らないことが重要です。大事なこ



第 日目		
第 日目		

第 日目			
第 日目			



第 二 目		
第 三 目		
第 四 目		

第 日目		
第 日目		
第 日目		

第 8 目		
第 8 目		

第 日目			
第 日目			